



A
MESSIEURS
DE
L'ACADEMIE
ROYALE.

MESSIEURS,

*Mon dessein n'est pas seulement
de vous dédier cet Ouvrage, comme à
de puissans Protecteurs ; mais c'est de
vous le présenter comme à des Juges
Souverains. Il est vray qu'en France
nous n'avons pas de cette sorte de
judicature que l'on voit à la Chine
où une Cour composée de sçavans*
à y



E P I T R E.

Mathematiciens, juge en dernier ressort de tout ce qui regarde les Mathématiques, qui font en ce pais-là une des plus importantes affaires de l'Estat. Si les loix du Royaume ne nous ont point donné cette juridiction, vous l'avez, MESSIEURS, par votre propre merite; & à considerer les personnes qui composent vostre Société, nous pouvons dire que ce n'est pas seulement une assemblée de ce qu'il y a de plus habiles hommes en Europe; mais que c'est une Cour souveraine, dont les jugemens peuvent passer pour autant d'Arrests parmi les sçavans. Que peut-on dire, quand on voit ce grand édifice qui s'éleve avec tant de magnificence, sinon que c'est un Palais qu'on bastit pour un nouveau Tribunal, & que le Roy qui surpasse les Empereurs Chinois dans la structure de ce bastiment, veut pent-estre

E P I T R E.

imiter leur politique dans l'érection de cette nouvelle Compagnie? Vous sçavez, MESSIEURS, que le Tribunal des Mathematiques de la Chine se tient ordinairement dans deux Observatoires, qui sont tout auprès des deux Villes Imperiales. Ceux qui nous en ont fait la description, nous disent qu'on ne voit rien en Europe de comparable, soit pour la magnificence du lieu, soit pour la grandeur des machines de bronze qui sont faites depuis sept cens ans, & qui estant exposées depuis plusieurs siècles sur les plate-formes de ces grandes tours, sont encore aussi entieres & aussi nettes que si elles ne faisoient que de sortir de la fonte. Les divisions en sont tres-exactes, la disposition tres-propre à observer, tout l'ouvrage tres-délicat: en un mot il sembloit que la Chine insultoit à toutes les autres

à iij

E P I T R E.

nations , comme si avec toute leur science & avec toutes leurs richesses elles ne pouvoient produire rien de semblable. Il falloit un Roy comme le nôtre pour réparer l'honneur de l'Europe ; & il faisoit des personnes comme vous , MESSIEURS , pour employer si à propos la magnificence d'un si grand Prince, & pour faire connoître à toute la terre que la France, sous la conduite de nos Ministres, sçait porter les choses au-delà de tout ce que peuvent entreprendre toutes les autres nations du monde. Ce ne sont pas seulement les murailles de ce superbe édifice qui me font parler de la sorte : ceux qui aiment les lettres auront encore plus de sujet de benir le gouvernement présent, quand on verra exécuter ces grands desseins que vous m'avez fait l'honneur de me communiquer. Et certainement

E P I T R E.

l'application avec laquelle vous vous occupez continuellement à faire de experiences de Physique, à polir les Arts, à enrichir les Mathematiques de vos nouvelles découvertes, feront voir bientôt que jamais les Arts & ces belles Sciences n'ont esté au point de perfection où vous les allez mettre. Je ne compte pas icy les desseins particuliers que plusieurs de vous ont bien avancez touchant l'Architectu- re, les Cartes de Geographie, la con- noissance des Plantes, l'Anatomie, le Mouvement, l'Optique & l'Astrono- mie. Je ne compte pas non plus cette belle Observation qui va paroistre en public touchant la grandeur de la Terre. A juger par l'excellence des instrumens dont l'Auteur s'est servi par son industrie à les manier, par la justesse de toutes ses operations, & par la connoissance parfaite qu'il

à iiij

E P I T R E.

de la Geometrie, on est déjà tres-persuadé que ce doit estre un ouvrage accompli. Tout cela, MESSIEURS, & plusieurs autres choses que je passe, font voir que vous estes en effet nos Juges, & que vous avez droit de prononcer sur nos Sciences. Agréez donc cét aveu public que je fais; & puisque l'integrité des Juges les plus severes ne nous empesche pas de les solliciter quelquefois, souffrez qu'en vous presentant cét Ouvrage, je vous le recommande, & que pour vous porter à le traiter favorablement, je vous asseûre qu'il vient d'une personne qui a pour vous tout le respect imaginable. C'est,

M E S S I E U R S ,

Vostre tres-humble & tres-obéissant serviteur, P A R D I E S.



P R E F A C E.

○ Eux qui compareront la petitesse
○ de cét Ouvrage avec la grandeur de
son titre, seront peut-estre d'abord rebuz
par la disproportion qui paroist entre
l'un & l'autre ; & il y a sujet de craindre
qu'ils ne prennent toutes ces promesses si
extraordinaires, que pour des expressions
trop hardies d'une personne qui s'engage
librement à faire ce qu'elle ne sçauroit exé-
cuter. Mais je les supplie de vouloir un peu
suspendre leur jugement, & de considérer
qu'on ne donne icy que la moitié de ces
élémens, & que des seize livres qu'ils doi-
vent contenir, on n'en publie maintenant
que neuf, parce que les autres expliquant
ce qu'il y a de plus profond & de plus re-
levé dans les inventions extraordinaires de
Geométrie, ne sont pas si nécessaires à
ceux qui veulent commencer à apprendre
cette Science. Cependant, dans ces pre-
miers livres, on ne laisse pas de traiter ce
qu'il y a de beau dans les quinze livres
d'Euclide, & outre cela, ce qu'Archimede
a démontré de la quadrature du cercle, les
Logarithmes, les

à v

P R E F A C E.

Sinus, & quelques autres choses de cette nature. On y verra les propriétés merveilleuses des nombres qu'Euclide a démontrées dans le septième, le huitième & le neuvième de ses Elemens. On y apprendra la démonstration des *Grandeurs incommensurables*, qui est peut-être l'effort le plus grand dont l'esprit humain soit capable, puisqu'allant fouiller jusques dans la possibilité des choses, il découvre avec tant de clarté ce qui est & ce qui n'est pas ; & que dans la multitude infinie des comparaisons qu'il regarde toutes comme possibles entre deux grandeurs, il démontre avec une assurance inébranlable, que Dieu mesme n'en voit pas une capable de fournir une commune mesure de ces deux grandeurs. Mais si cette démonstration est belle, il faut avouer qu'elle est bien difficile : ceux à qui nous avons l'obligation d'une si grande découverte, ne nous ont point montré d'autre route que celle qu'ils ont tenuë eux-mesmes, soit qu'en effet ils n'en aient point connu d'autre, soit qu'ils aient voulu par là nous faire experimenter une partie de leur peine, & nous faire goustier en mesme temps avec d'autant plus de plaisir les délices de ce nouveau monde, que nous aurons eû plus de peine à y parvenir. Quoy qu'il en soit, ce chemin est si long & si plein de difficultez, qu'il se trouve fort

P R E F A C E.

eu de personnes qui ayent ou assez de confiance pour en supporter l'ennuy, ou assez de force pour en surmonter la fatigue. Je ne say si j'oseray dire que j'ay esté assez heureux pour découvrir une nouvelle route. Ce seroit pas une fort grande louange pour moy : un matelot aventurier est quelquefois plus heureux à faire quelque nouvelle découverte, que le plus sage Pilote ; & le hazard fait trouver mesme dans la tempeste, ce qu'on n'auroit sceû découvrir avec toute la connoissance que l'on pourroit avoir de la Marine. Il se pourroit faire aussi que courant comme j'ay fait ces vastes mers de la Geometrie, le hazard m'auroit fait rencontrer une route nouvelle & inconnüe aux grands hommes qui m'ont précédé. Je ne rétiens pas néanmoins m'attribuër cette bonne fortune ; mais je puis bien dire du moins que la route que je tiens pour aller aux Incommensurables est tres-courte & res-aisée, & que pour peu d'attention que l'on veuille apporter à la lecture de quatre ou cinq petites pages, on comprendra parfaitement une chose que très-peu de personnes, mesme de ceux qui se meslent de Geometrie, sont capables d'entendre.

Après cela je traite de diverses sortes de progressions, & j'insiste particulièrement sur les deux plus celebres, qui sont la Geometrique & l'Arithmetique ; & les compa-

P R E F A C E.

rant l'une avec l'autre , je traite des Logarithmes , & j'en fais voir l'artifice par le moyen d'une ligne geometrique , qui sera tres-utile pour la résolution des Problèmes d'Algebre de toutes sortes de dimensions. C'est cette ligne avec laquelle j'ay quarré autrefois l'Hyperbole ; & ce qu'un de mes amis m'a fait voir depuis peu dans le sçavant Journal d'Angleterre, touchant ce qui a esté publié sur cette matiere par de tres-sçavans Geomètres, ne m'a point surpris, & mesme cela m'a fait penser que ces Messieurs n'avoient pas voulu nous communiquer tout ce qu'on pourroit dire sur ce sujet. Je finis cette premiere partie par la pratique de la Geometrie ; ce qui devoit faire le dernier livre de tous ces Elemens. Outre les operations les plus faciles & les plus communes , j'y donne les principes pour mesurer les grandeurs & les distances des lieux inaccessibles , pour faire la carte d'une Place ou d'une Province ; pour trouver les sinus , les tangentes , & les secantes de tous les angles ; & enfin pour avoir la connoissance de tout ce qui appartient à cette partie , que l'on appelle la Geometrie pratique.

Après cela je donneray dans tout autant de livres , l'Algebre , les Sections Coniques , les Spheriques , & la Statique ; mais sur tout j'établiray cinq ou six regles gé-

P R E F A C E.

nérales , desquelles ensuite , comme par des corollaires , on tire la démonstration d'une infinité de propositions qui passent pour grandes dans la Geométrie. C'est là qu'on trouvera la nature & la mesure des espaces asymptotiques , dont la connoissance est la chose du monde la plus admirable , & qui fait voir le plus clairement la grandeur & la spiritualité de nostre ame , puisque par la seule lumière de son esprit , penetrant au-delà de l'infini , elle découvre si clairement des choses , que nulle experience sensible ne luy peut apprendre , & qu'aucune puissance corporelle ne sçauroit seulement appercevoir. Ces espaces sont d'une étendue actuellement infinie , compris entre deux lignes , qui estant prolongées à l'infini , ne se rencontrent jamais ; d'où leur vient leur nom d'Asymptotes. Cependant on démontre que ces espaces infinis en longueur, sont néanmoins égaux à un cercle ou à une autre figure déterminée : de sorte que l'Infini mesme , tout immense & tout innombrable qu'il est , se réduit néanmoins au calcul & à la mesure de la Geometrie , & que nostre esprit encore plus grand que luy, est capable de le comprendre. De toutes les connoissances naturelles que l'homme peut aquerir par son propre raisonnement , sans doute la plus admirable est

P R E F A C E.

cette comprehension de l'infini : & je ne voy rien de plus propre à nous convaincre de l'existence de nostre ame , & à nous faire reconnoître, qu'outre la faculté materielle que nous avons d'imaginer par le moyen des organes, nous en avons une toute spirituelle pour penser & pour raisonner, que le plus grand de tous les Philosophes appelle *une puissance indépendante des organes, séparée de la matiere, & venant d'ailleurs que du corps.* En effet, quelque effort que nous fassions pour imaginer l'infini, nous n'en viendrons jamais à bout ; & tandis que nous nous en tiendrons à la seule imagination, nous pourrions bien nous figurer une espace d'une vaste étendue, mais il sera toujours borné : parce que l'imagination estant, à proprement parler, une puissance corporelle, qui ne nous represente rien que par des fantômes & par des images sensibles, doit estre elle-même, comme le corps, bornée dans ses representations. Et comme un tableau ne sçauroit représenter à nos yeux une étendue actuellement infinie, à cause que ce qui est borné dans un certain espace ne peut contenir ce qui n'a point de bornes ; aussi l'imagination n'estant qu'un tableau qui nous represente des images à la verité bien subtiles, mais toujours materielles, ne sçauroit nous faire voir que des choses.

P R E F A C E.

corporelles & limitées, toute l'immensité de l'infini ne pouvant estre contenuë dans les bornes d'une peinture corporelle. L'imagination ne peut donc atteindre jusques là, que de nous représenter l'infini. Mais d'ailleurs la démonstration que nous faisons de la nature & des propriétés de cette immense & infinie étendue asymptotique, nous convainc également que nous avons dans nous une faculté capable de nous représenter cette étendue infinie. Car comme afin de mesurer avec la regle & le compas une figure représentée sur du papier, il faut que j'aye cette figure présente à mes yeux & à ma main, afin qu'appliquant l'instrument à ses angles & à ses costez, je puisse en prendre toutes les dimensions, & en déterminer ainsi la grandeur; de mesme, afin que par la regle de ma raison je prenne les mesures de cet espace asymptotique, il faut que j'en aye une idée intimement présente à mon esprit, & que ce mesme esprit s'appliquant, pour ainsi dire, à cette idée & à cette figure interieure, il en prenne les dimensions, en détermine la grandeur, & en démontre toutes les propriétés. Il faut donc reconnoître que nous avons en nous des idées & des représentations claires & distinctes d'une étendue infinie; & que par consequent cette faculté qui nous représente ainsi ce que nul corps ne peut repre-

P R E F A C E.

senter, est une puissance purement spirituelle & distincte de la matière : de sorte que la Geométrie, par une seule démonstration, prouve également une des plus admirables propriétés de la nature, & en même temps une des deux plus importantes vérités de la Morale.

Oseray - je passer encore plus avant, & dire que dans cette même démonstration on trouve aussi la preuve invincible de l'existence de Dieu ? Je sçay que la nature divine est un abysme de lumière, qui se répand par tout, & qui se fait sentir aux esprits les plus aveugles & les plus stupides : mais je sçay aussi jusqu'à quel point est allée l'impiété des libertins, qui ne pouvant résister à leurs propres convictions, ni se répondre à eux-mêmes, taschent d'éluder au dehors les démonstrations des autres, en se retranchant dans l'embarras de l'éternité ; & ils pensent estre fort à couvert dans cette multitude infinie de causes dépendantes, & trouver toujours lieu de fuir dans la suite éternelle de diverses productions. Mais la Geométrie, par un exemple manifeste des asymptotes, démontre invinciblement, que même dans cette prétendue suite des causes subordonnées & dépendantes les unes des autres à l'infini, il faut nécessairement en venir à une première nature, qui concourant avec toutes

P R E F A C E.

ces causes particulières, & correspondant à tous les temps, soit elle-mesme infinie & éternelle, & qui ne produisant toute seule aucune de ces causes sans le concours & sans la détermination des autres, soit néanmoins la cause générale qui produit & qui conserve toutes choses.

Peut-estre, après tout, qu'on pensera que je mets icy les choses en abrégé seulement, & que cette Geométrie pourra bien servir de memoires à ceux qui sçauront déjà cette science, mais non pas d'instruction à ceux qui la veulent apprendre. Je déclare que cela est bien éloigné de mon intention, qui n'a jamais esté de faire un abrégé: j'ay toujours prétendu faire une Geométrie qui pust servir à ceux qui commencent, & où ceux mesme qui n'ont jamais ouï parler de Mathematiques, puissent apprendre en fort peu de temps, non seulement ce qui est le plus nécessaire dans la Geométrie, mais encore ce qu'il y a de plus relevé. Je sçay qu'en cette matiere les livres les plus courts ne sont pas toujours les plus clairs; & parmi le grand nombre de ceux qui ont voulu nous faciliter la lecture & l'intelligence d'Euclide, plusieurs en ont bien amoindri le volume; mais tous n'ont pas pour cela accourci le temps qu'il faut pour le comprendre. Entre tous les Commentateurs, le plus long, à mon avis, est

P R E F A C E.

Clavius, & le Pere Fournier est le plus court; je suis néanmoins persuadé qu'il faut plus de temps pour entendre passablement Euclide dans le Pere Fournier, que pour le comprendre dans Clavius: tant il est vray que dans la Geométrie on ne doit pas mesurer le temps de l'étude par la grandeur ou la petitesse du volume. Ainsi dans le dessein que j'ay eû de donner le moyen d'apprendre cette Science avec le plus de facilité qu'il me seroit possible, je ne me suis pas tant étudié à estre court dans les écrits, qu'à me rendre intelligible dans la façon de proceder; & si ce volume paroist fort petit, cela ne vient pas tant de la briéveté des démonstrations particulieres, que de la facilité de la methode générale. Car il faut remarquer qu'une des choses qui rendent difficile & ennuyeuse la lecture d'Euclide & des Auteurs ordinaires, c'est que dans l'exactitude rigoureuse qu'ils ont de ne laisser passer sans démonstration rien de ce qui se peut démontrer, pour facile qu'il paroisse d'ailleurs; il arrive souvent que ce qui eust esté clair, si on se fust contenté de le proposer à l'esprit, tel qu'il paroist naturellement, devient difficile & embarrassé, lors qu'on veut le réduire à une démonstration réguliere. De plus, il se trouve souvent, que pour démontrer une proposition im-

P R E F A C E.

portante, Euclide employe une tres-grande suite de propositions, qui ne servent proprement à rien, qu'à prouver cette principale proposition. Si donc par la seule exposition on vient à faire appercevoir la vérité, sans se mettre en peine de démontrer ce de quoy on est pleinement convaincu, & sans employer des discours qui ne semblent servir qu'à nous faire desapprendre ce que nous ne sçaurions ignorer, on s'épargnera bien de la peine. De mesme, si l'on peut tout d'un coup démontrer ces propositions capitales & importantes d'Euclide, sans employer cette longue suite de démonstrations, & sans tant de préparatifs, on aura sans doute le moyen de retrancher bien des choses inutiles : c'est ce que je pense avoir fait en plusieurs endroits, démontrant dans une seule proposition ce qui n'est ordinairement prouvé que par cette suite ennuyeuse d'autres propositions. Un autre moyen d'abreger, dont je me suis servi, c'est de réduire les choses sous de certains principes généraux ; ce que j'ay fait non seulement dans ce livre, où par cinq ou six regles universelles je démontre une infinité de grandes propositions, mais aussi en beaucoup d'autres endroits, comme lors que traitant des Sections Coniques, je démontre les propriétés des quatre par quelque une des pro-

P R E F A C E.

priérez qui est particuliere à une seule section. Par exemple, les considerant toutes sous les proprieté de l'Ellipse, je dis que le Cercle est une ellipse, dont les deux foyers se touchent ; que la Parabole est une ellipse, dont les deux foyers sont infiniment éloignez l'un de l'autre ; & que l'Hyperbole est une ellipse, dont les foyers sont plus qu'infiniment éloignez : ce qui a un fort bon sens, comme je l'explique en cet endroit.

Quelqu'un sans doute trouvera mauvais que j'aye laissé la methode ordinaire de ranger les définitions, les principes & les propositions ; & il croira peut-estre que je fais tort à la Geométrie, de luy oster ce qui l'a toujours fait passer pour la Science la plus exacte. Un autre me reprochera que j'ay encore gardé quelques vieilles façons de démontrer, après que les modernes, par cette politesse si propre au temps où nous sommes, ont donné des démonstrations bien *plus naturelles*, & ont fait voir la difference qu'il y a entre *éclairer l'esprit*, & *le convaincre*. On me dira encore que je me suis negligé en beaucoup de choses ; que j'ay avancé plusieurs propositions sans les démontrer ; que je cite souvent des endroits, qui ne prouvent pas directement ce qui est en question ; que je me sers indifferemment de la *Converse*, & de la


P R E F A C E.

proposition même. A tout cela je réponds en un mot, que dans le dessein que j'avois d'enseigner la Geométrie avec toute la facilité possible, la voye que j'ay suivie m'a semblé la plus propre : ce qui ne m'empêchera pas néanmoins de profiter des avis que les personnes intelligentes auront la bonté de me donner.

Cependant je m'apperçois, que faisant profession d'estre fort court dans cet Ouvrage, je suis excessivement long dans la Préface. Ainsi je ne m'arreste pas à faire voir les grands avantages de la Geométrie : je dis seulement, que si jamais elle a esté de quelque utilité dans l'étude des Sciences naturelles, & dans la pratique des Arts, elle est maintenant de la dernière nécessité pour l'un & pour l'autre. On sçait à quel point on a porté dans nostre siècle la perfection des Arts, & avec quelle pénétration l'on va approfondir les matieres les plus cachées de la Physique. De la façon qu'on s'y prend aujourd'huy, la Geométrie est nécessaire aussi-bien que la Méchanique, qui n'est qu'une Geométrie appliquée au mouvement local, & ceux qui ont maintenant plus de vogue, sont intelligibles, si l'on n'a ces deux connoissances. Pour ce qui est de la Méchanique, j'en ay donné une partie des Elemens dans un discours du Mouvement local,

P R E F A C E.

que je ne dois pas avoir honte d'avouër pour mien ; & j'espère qu'avec ce que je publie maintenant dans ce livre de Géométrie , on aura deux grands moyens d'entendre la Physique de ce temps , & d'en bien juger : & peut-estre trouvera-t-on que ceux qui ont la réputation d'avoir établi leur Philosophie sur les fondemens de la Géométrie & des Méchaniques, ne sont pas toujours inébranlables ; & que cela mesme qui a servi à faire valoir leur doctrine , servira à faire connoître leurs erreurs. Je veux encore avertir le lecteur que je ne prétens nullement vouloir passer pour Auteur de ce que je donne dans cet Ouvrage ; j'ay pris de tous costez ce qui m'a agréé : & si quelqu'un y trouve quelque chose qu'il pense estre de son invention, ou de quelque autre, qu'il le prenne hardiment, & qu'il l'attribuë à son Auteur, j'y consens volontiers , & je ne les luy contesteray point. Que si par hazard il y rencontre quelque chose qui ne se trouve point ailleurs , & qu'il veuille me l'attribuër, alors je le reconnoistray pour mien, de peur qu'il ne soit à personne.





AVIS A CEUX QUI VEULENT APPRENDRE LA GEOMETRIE.

IL faut s'accoutumer à considérer les figures en mesme temps qu'on lit. On y a de la peine au commencement ; mais on y est rompu dans deux ou trois jours.

Il ne faut point se rebuter, si l'on trouve des choses qu'on ne comprend pas d'abord ; la Geométrie ne s'apprend pas aussi aisément qu'une histoire.

Si après avoir leû avec attention une proposition, on ne l'entend pas, il faut passer outre ; on l'entendra peut-être dans la suite, ou du moins lors qu'après avoir tout parcouru, on recommencera à lire tout de nouveau. En fait de Geométrie, on ne comprend jamais bien les choses à la premiere lecture.

Les nombres qui se trouvent entre des parenthèses, comme par exemple, (3. 24.) marquent que ce qu'on dit en cet endroit est prouvé ailleurs, sçavoir icy au troisième livre, à l'article vingt-quatrième; de sorte que le premier chiffre marque le livre, & les autres marquent l'article; & il faut aller consulter ces articles-là, pour sçavoir la preuve de ce qu'on lit.

Quand on trouve des mots qu'on n'entend pas, il faut consulter la table qui est à la fin.

Il est bon d'avoir un Maître au commencement qui explique ces démonstrations, & par ce moyen on apprend beaucoup plus aisément qu'on ne feroit de soy-mesme en lisant.



ELEMENS



ELEMENS DE GEOMETRIE.

LIVRE PREMIER.

Des Lignes, & des Angles.

1. **P**AR le nom de *Quantité* nous entendons une chose, qui estant comparée à une autre de mesme nature, peut estre appellée plus grande, ou plus petite; égale, ou inégale: comme sont l'Etenduë, le Nombre, la Pesanteur, le Temps, le Mouvement; & toutes ces choses, en tant qu'elles se peuvent ainsi comparer, suivant le plus ou le moins, sont l'objet de la Geometrie.

2. On s'arreste néanmoins à considerer particulièrement l'Etenduë, comme celle qui peut servir d'exemple & de regle à mesurer toutes les autres *Quantitez*.

3. La quantité, qui a de l'étenduë seulement en longueur, sans aucune profondeur, s'appelle *Ligne*: celle qui est étenduë en longueur & en largeur, s'appelle *Surface* ou *Superficie*: celle qui a de la longueur, & de la largeur, & de la profondeur, s'appelle *Corps* ou *Solide*.

4. Le *Point* est un endroit de la *Quantité*, lequel on considère comme s'il n'avoit aucune étenduë, & qu'il fust indivisible de tous costez: ainsi les extrémités, ou le milieu d'une ligne, sont des *Points*.

5. Il y a des lignes *Droites*, & des lignes *Courbes*: de même il y a des surfaces *Planes*, qui s'appellent *des Plans*: & des surfaces *Courbes*, qui sont *Convexes* en dehors, comme le dessus d'une voûte, & *Concaves* en dedans, comme le dessous d'une voûte.

6. Lorsque deux lignes se touchent en un point, & vont ensuite en s'éloignant l'une de l'autre, il se fait entre ces lignes un *Angle*, qui s'appelle *Rectiligne* quand les deux lignes sont droites, *a*: *Curviligne* quand elles sont courbes, *b*: & *Mixte* quand l'une est courbe, & l'autre droite, *c*.



DE GEOMETRIE, LIV. I. 3

7. L'angle est dit estre d'autant plus petit, que les lignes qui le font, sont plus inclinées l'une vers l'autre. Prenez deux lignes ab & ac , qui se touchent en a : si vous imaginez que ces deux lignes s'ouvrent comme un compas, en sorte qu'elles demeurent toujours attachées en a comme par le clou du compas, tandis que l'extrémité c s'écarte de l'extrémité b ; alors vous concevrez que plus ces extrémités s'éloigneront mutuellement, plus aussi se fera grand l'angle qui est entre deux : & au contraire, si vous approchez davantage ces extrémités, vous ferez que les lignes seront plus inclinées, ou plus panchées l'une vers l'autre, & l'angle en sera plus petit.




8. Il faut donc bien remarquer que la grandeur des angles se mesure, non par la longueur des lignes qui le font, mais par leur inclination. Par exemple, l'angle b est plus grand que l'angle a , quoy - que les lignes de b soient plus courtes : parce qu'elles ne sont pas si inclinées l'une vers l'autre, que le sont les lignes de l'angle a ; & pour le comprendre, on n'a qu'à s'imaginer que l'an-



gle b est posé sur l'angle a , comme on le voit par les lignes ponctuées, qui représentent l'angle b . Car pour lors on verra que l'angle b contiendra aisément au dedans de soy l'angle a , & que les lignes d' a seront bien plus inclinées l'une vers l'autre, que ne le sont les lignes de b ; & qu'ainsi enfin l'angle a est plus petit.

9. L'angle se désigne ordinairement par trois lettres, dont celle du milieu marque le point où les deux lignes se touchent, comme en la figure suivante; $b a c$ marque l'angle fait par les deux lignes $b a$ & $a c$, en sorte que a est le point commun où les lignes se touchent.



10. Si nous imaginons une ligne $a b$ attachée par le bout a au milieu de la ligne $d c$, & que de plus nous fassions mouvoir cette ligne autour du point a ; quand elle sera revenuë au lieu d'où elle avoit commencé à se mouvoir, l'extrémité b aura décrit une ligne courbe, qui s'appelle *Cercle*, ou plustost *Circonférence* de cercle: car, à proprement parler, le *Cercle* est tout l'espace renfermé dans cette circonférence.

11. Une partie de la circonférence s'appelle *Arc*, comme $a b$.


DE GEOMETRIE, LIV. I. 5

12. La ligne $d c$ terminée par la circonference, s'appelle *Diametre*, qui partage le cercle en deux également, ce qui n'a pas besoin de preuve. Aussi toute ligne droite qui sera tirée par le *Centre*, c'est à dire, par le point a , partagera le cercle en deux parties égales, & fera aussi un autre diametre.

13. La ligne $a b$, ou $a c$, ou toute autre tirée du centre à la circonference, s'appelle *Rayon*, ou *Demidiametre*.

14. Tous les rayons ou demidiametres sont égaux.

15. Quand l'extrémité B est également éloignée des deux extrémités du diametre c & d , c'est à dire, quand B se trouve au milieu de la demicirconference ; alors




cette ligne $B a$ fait deux angles, qu'on appelle *Droits*, qui sont égaux de part & d'autre, l'un $B a c$, & l'autre $B a d$. Et si la ligne $B a$ est prolongée au-delà vers e , elle fera quatre angles droits, & elle fera un nouveau diametre, qui avec le premier partagera le cercle en quatre parties égales.

16. Alors les lignes sont dites *Perpendiculaires* l'une à l'autre, $B a$ à $d c$, & $d a$ à $B e$.

6 E L E M E N S

17. Mais si b est plus proche de l'une des extrémités du diamètre que de l'autre, alors cette ligne est dite *Oblique*, & fait de part & d'autre deux angles inégaux, dont le plus petit s'appelle *Aigu*, $b a c$ & le plus grand s'appelle *Obtus*, $b a d$. Que si la ligne $b a$ est prolongée jusqu'à e , elle sera un nouveau diamètre, & fera en dessous deux nouveaux angles : de sorte qu'il



y aura en tout quatre angles, desquels on appelle *Opposés par la pointe*, les deux qui se touchent seulement de la pointe comme $b a c$, & $e a d$, ou bien $b a d$, & $c a e$: mais ceux qui ont un côté commun, s'appellent *Angles de suite*, comme $d a b$, & $b a c$, ou bien $b a c$, & $c a e$, &c.


18. Les angles qui prennent des arcs égaux, sont aussi égaux. Comme si l'on prouve que l'arc $c b$ est égal à l'arc $e d$, on aura aussi prouvé que l'angle $c a b$ est égal à l'angle $e a d$.

19. Ces deux angles qui sont de suite, pris ensemble, sont toujours égaux à deux droits. Car comme la ligne $d c$, est diamètre, & qu'elle coupe le cercle en deux également, les deux arcs $c b$ & $b d$ pris ensemble, seront égaux à la demi-circumference. Ainsi les deux angles $c a b$

DE GEOMETRIE, LIV. I. 7

& $b a d$ pris ensemble, seront égaux à deux droits, puis qu'ils remplissent le demi-cercle, comme les deux droits.

20. Ainsi cette proposition est générale, qu'une ligne droite tombant sur une autre ligne droite, fait les deux angles de suite ou droits, ou égaux à deux droits. Car si les lignes sont perpendiculaires, comme $B a$ sur $d a c$, les angles sont droits de part




& d'autre. (15.) Que si la ligne est oblique, comme $b a$, sur la même $d c$, alors les angles sont bien inégaux; mais de tout autant que l'obtus surpasse un droit, de tout autant aussi l'aigu est surpassé par un autre droit. Ainsi la petitesse de l'un est récompensée par la grandeur de l'autre.

21. Si deux angles qui ont un costé commun, sont égaux à deux droits, leurs autres costez feront une ligne droite. Soient les angles $d a b$ & $b a c$ égaux deux droits, je dis que la ligne $a d$ avec la ligne $a c$ fait une ligne droite; (fig. de l'art. 17.) ce qui est clair par ce qui a esté dit. Car si du centre a on tire un cercle $d b c$, les deux arcs $d b$, $b c$ seront égaux à la demi-circonférence, puis qu'on suppose que ces deux angles sont égaux à deux droits. Ainsi les lignes $d a$, $a c$ seront le diame-


te, & par conséquent seront *en droite ligne, posita in directum*.

22. Si d'un point donné *a* on élève diverses lignes *ab, ac, af, ad, &c.* elles feront divers angles; & tous ces angles en-



semble, en quelque nombre qu'ils soient, seront égaux à quatre droits: car il est clair que tous ces angles remplissent le cercle dont ils divisent la circonference en autant d'arcs *bf, fc, ed, dc, cb*. Ainsi tous ces arcs ensemble sont égaux à quatre quarts de cercle, c'est à dire, que tous ces angles sont égaux à quatre droits; car aussi quatre angles droits remplissent le cercle.

23. Les angles *opposés par la pointe* sont




égaux entre eux. Soient deux lignes droites *dac, & baec*, je dis que l'angle *bac*, est égal à l'angle *ead*: car l'arc *cb*, avec l'arc *bd*, fait la demi-circonference, (12.) & de même l'arc *bd* avec l'arc *de*, fait aussi la demi-circonference: Donc l'arc *bc* est égal à l'arc *de*, puis que l'arc *bd* fait toujours la même quantité, soit qu'on l'ajoute avec l'arc *bc*, ou avec l'arc *de*. Par même raison l'angle *dab* est égal à l'angle *cae*.

DE GEOMETRIE, LIV. I. 9

24. On divise toute la circonference du cercle en 360. parties égales, qui s'appellent *Degrez*, & chaque degré en 60. parties égales, qui sont les *Minutes*, & chaque minute en 60. *Secondes*, chaque seconde en 60. *Tierces*, & ainsi à l'infini. Et quand on veut déterminer la grandeur des angles, on compte les degrez qu'ils comprennent. Par exemple, quand on dit un angle de 90. degrez, on entend un angle droit, parce qu'un angle droit comprend la quatrième partie de la circonference, laquelle contient 90. degrez, puis que toute la circonference en contient 360. dont la quatrième partie est 90. De mesme un angle de 60. degrez est un angle qui fait les deux tiers d'un droit.


25. Les Minutes se marquent par un petit trait, comme une virgule qu'on met à costé du chiffre : & les Secondes par deux de ces traits " : les Tierces par trois " : les Quartes par quatre, &c. comme 25. d. 32'. 43". ce qui veut dire 25. degrez, 32. minutes, 43. secondes.

26. Deux lignes sont dites estre *Paralleles*, quand elles sont par tout également éloignées l'une de l'autre. Les deux lignes *ab* & *ed* sont paralleles, si elles sont également éloignées



en *ae*, & en *bd*, ou en *BD*, & en tout autre endroit.

A V



27. Cét éloignement se mesure par des perpendiculaires. Comme si du point *a* on s'i-

magine que la ligne *ae* tombe perpendiculairement sur *ed*; & si de mesme *bd* tombe perpendiculairement sur *de*: nous concevrons naturellement que si ces deux perpendiculaires *ae*, *bd*, sont égales, les deux lignes *ab*, *ed* seront également éloignées l'une de l'autre en ces deux endroits; cela est naturellement connu sans autre preuve.

28. Deux lignes paralleles estant continuées à l'infini, ne viennent jamais à se toucher: car puis qu'elles sont toujours également éloignées, on peut par tout tirer entre deux une perpendiculaire égale à *ae*, ou à *bd*: & par consequent elles ne se touchent jamais.

29. Si une ligne coupe deux autres lignes paralleles, elle sera également inclinée sur l'une & sur l'autre: & si une ligne coupant deux autres lignes, est également inclinée sur l'une & sur l'autre;




ces deux lignes seront paralleles. Soient les deux lignes paralleles *cae*, *dbf* coupées par la ligne *gabb*: je dis que cette ligne *gabb* est inclinée sur *cae*, de mesme que sur

DE GEOMETRIE, LIV. I. 11


abf; c'est à dire, que l'angle *gae* est égal à l'angle *gbf*. Cecy est naturellement connu pour peu d'attention qu'on y apporte. Car si l'angle *gae*, par exemple, estoit plus grand, & que la ligne *ae* fust plus écartée d'*ag*, le point *e* de la ligne *ae* pancheroit vers *f*, puis que *bf* ne s'écarteroit pas tant qu'*ae*; ainsi ces deux lignes, *ae*, & *bf* ne seroient point paralleles. De plus, si nous imaginons ces deux lignes comme les costez d'une regle, nous pouvons considerer route cette regle, comme une ligne indivisible. Ainsi les angles *hbd* & *cag* seront comme les *angles de suite* égaux à deux droits, (20.) & les angles *hbd* & *gae* seront comme les deux angles *opposez par la pointe* égaux entre eux. (23.)

30. Lors qu'une ligne coupe deux paralleles, il se fait huit angles, dont les quatre *a*, *b*, *h*, *g*, sont *externes*, les autres sont *internes*. Les angles *c* & *f*, ou bien *d* & *e*, sont appelez *Alternes*: les angles *b* & *f*, ou bien *a* & *e*, sont *alternativement opposez*: les angles *d* & *f*, ou bien *c* & *e*, sont les *internes de mesme costé*.



31. Les angles alternes, & alternativement opposez, sont égaux entre eux; comme *b*, *f*, *c*, *h*, & *a*, *e*, *d*, *g*, (29.)

32. Lors qu'une ligne tombe ainsi sur deux parallèles, elle fait les angles internes de mesme costé égaux à deux droits.



L'angle *d* avec l'angle *f* est égal à deux droits, parce que *f* est égal à *e*. (31.) Or *e* avec *d* fait deux angles droits: (20.) Donc aussi *f* avec *d* fera deux angles droits, ce qu'il falloit démontrer.


33. Une proposition est appelée *Converse* d'une autre, quand après avoir tiré une conclusion de quelque chose qu'on a supposée, on vient dans cette autre proposition converse à supposer ce qui avoit esté conclu, & à en tirer ce qui avoit esté supposé. Par exemple, icy nous disons, si les lignes sont parallèles, les angles *d* & *f* seront ensemble égaux à deux droits, où nous supposons que les lignes sont parallèles; & de là nous concluons: Donc les angles, &c. La *Converse* se fera ainsi. Si les angles *internes de mesme costé d* & *f* sont égaux à deux droits, les lignes seront parallèles: où après avoir supposé que ces angles valent deux droits, nous concluons que les lignes seront parallèles.

34. Les *Converses* en cet endroit sont véritables, sçavoir que si une ligne coupant deux autres lignes fait les angles alternes égaux, ces deux lignes sont parallèles;

DE GEOMETRIE, LIV. I. 13

35. Si deux lignes sont paralleles à une troisieme, elles le seront entre elles.

Soit la ligne ab parallele à cd , & ef parallele aussi à la mesme cd , je dis que ab est pararelle à ef : car si l'on tire une ligne



bdf qui les coupe toutes trois, l'angle b sera égal à l'angle d , (31.) & de mesme l'angle f sera égal à l'angle d : (31.) Donc l'angle b est égal à l'angle f , parce que c'est un principe, que si deux choses sont égales à une troisieme, elles sont égales entre elles. Puis donc que l'angle b est égal à f , il s'ensuit que la ligne $a b$ est parallele à ef . (34.)



XX

LIVRE SECOND.

Des Triangles.

1. **U**N E *Figure* est un espace renfermé de toutes parts. Si les lignes qui la terminent sont droites, elle s'appelle *figure Rectiligne*; si elles sont courbes, elle s'appelle *Curviligne*; & si elles sont en partie droites, & en partie courbes, la *figure* s'appelle *Mixte*.

2. Il y a des figures *Planes*, qui sont sur une surface plane, & des figures *Solides* qui sont un corps avec trois dimensions. On parle icy seulement des figures planes.



3. Toutes les lignes qui renferment la figure prises ensemble, font la *Circonférence*, ou le *Perimetre*, ou le *Circuit* de la figure.

4. De toutes les figures planes curvilignes, ou mixtes, on ne considère proprement dans la Geométrie ordinaire que le cercle, ou une partie de cercle, terminée d'un costé par un arc, & de l'autre par une ou plusieurs lignes droites.

5. Parmi les rectilignes, les plus simples figures sont les *Triangles*, qui sont terminées par trois lignes, lesquelles sont trois angles.

DE GEOMETRIE, LIV. II. 33

6. Un triangle, qui a un angle droit, s'appelle *Triangle rectangle*, *a*: s'il a un angle obtus, il s'appelle *Obtusangle*, ou




Ambligone, *b*: s'il a trois angles aigus, il s'appelle *Acutangle*, ou *Oxygone*, *c*, *e*.




7. Quand le triangle a tous les trois costez inégaux, il s'appelle *Scalene*, *a*, *b*: s'il a deux costez égaux, il est *Isocele*, *e*: si tous les trois costez sont égaux, il est *Equilateral*, *c*.

8. Si l'on prend deux costez du triangle, on peut les appeller *Iambes*, & le troisiéme costé pour lors s'appellera *Base*. Tout costé peut estre pris pour *Base*.

9. En tout triangle les trois angles ensemble sont égaux à deux droits. Soit le triangle *abc*, je dis que l'angle *a*, plus l'angle *c*, plus l'angle *abc*, valent deux droits: car si nous imaginons une ligne *bd*




parallele à *ac*, ces deux lignes parallèles seront coupées par la troisiéme *bc*, & par consequent les angles alternes seront égaux, c'est à dire, que l'angle *c* est égal à l'angle *cbd*. (1. 31.) De plus, la ligne *bd*



tombant sur les parallèles bd & ac , elle fait les angles internes de même costé égaux à deux droits, (1. 32.) c'est à dire, que l'angle abd , plus l'angle a sont égaux à deux droits. Or l'angle abd est composé de deux angles, dont l'un est abc , (qui est un des trois du triangle) & l'autre est dbc , que j'ay fait voir estre égal à l'angle c : Donc aussi ces trois angles abc , plus c , plus a valent deux droits; ce qu'il falloit démontrer.

10. Si l'on prolonge la base d'un triangle, l'angle externe est égal aux deux internes opposez. Soit le triangle abc , & qu'on prolonge le costé ca vers e , il se




fait un angle en dehors bae , qui s'appelle l'angle externe du triangle. Or je dis que cet angle externe bae est égal aux deux angles b & c , qui sont les internes opposez, car ces deux angles b & c avec le troisième bac font ensemble deux droits (par la précédente) & de même, ce troisième angle bac avec l'angle bae , fait aussi deux droits: (1. 20.) Donc les angles b & c font tous deux autant que l'angle bae ; ce qu'il falloit démontrer.

11. Si un triangle ABC a deux costez AB & AC , égaux aux deux costez a b , a c d'un autre triangle, & si de plus l'angle A est

égal à l'angle a : je dis

que le troisième costé

BC sera é-




gal à bc , & l'angle B à l'angle b , & C à c , & tout le triangle ABC à tout le triangle abc . Car si nous imaginons que le triangle abc soit posé sur ABC , en sorte que le costé ab soit précisément sur AB qui luy est égal, le costé ac tombera aussi sur AC : puisqu'on suppose que l'angle a est égal à l'angle A ; & ainsi le point c tombera sur C , puisque ac est égal à AC : Donc aussi bc tombera sur BC , & par consequent luy sera égal; & de mesme l'angle c sera égal à C , & b à B , & tout le triangle à tout le triangle, puisque tout se répond si bien, que rien du triangle de dessus ne passe au-delà de celui de dessous.

12. Les figures qui s'ajustent ainsi, & se correspondent parfaitement quand elles sont mises l'une sur l'autre, s'appellent figures *congruës*, *que mutuo sibi congruunt*; & c'est une maxime générale, *Qua mutuo sibi congruunt, aqualia sunt*: les choses qui

estant ainsi mises l'une sur l'autre, se correspondent parfaitement, sont égales.

13. La converse aussi de la proposition précédente est véritable; sçavoir, que si un triangle a tous ses trois costez égaux aux trois costez d'un autre triangle; tous les angles de l'un seront aussi égaux aux angles de l'autre, & tout l'espace que contient un triangle, sera aussi égal à l'espace que contient l'autre triangle:



comme si
 AB est égal à ab ,
 & AC à ac ,
 & BC à bc :
 je dis que

l'angle A sera égal à l'angle a , & B à b , & C à c , & tout le triangle ABC à tout le triangle abc ; ce qui n'a pas besoin d'autre preuve.

14. Si l'angle A est égal à l'angle a , & l'angle B à l'angle b , & le costé AB au costé ab ; le costé AC le sera aussi au costé ac , & BC à bc , & tout le triangle ABC à tout le triangle abc : cela est aisé à prouver par les précédentes.



15. En tout triangle Isoscele, les deux angles qui se font sur la base par les jambes égales, sont égaux entre eux. Soit le triangle abc , dont la

DE GEOMETRIE, LIV. II. 13

jambe $a b$ soit égale à $a c$, je dis que l'angle b est égal à l'angle c : car si nous imaginons que la base $b c$ est partagée également en d , la ligne $a d$ fera deux triangles $a d c$ & $a d b$, & les trois costez de l'un seront égaux aux trois costez de l'autre; car $a c$ est égal à $a b$ par l'hypothese ou supposition de la proposition mesme; $d c$ est égal à $d b$, parce que nous supposons icy que la base $b c$ est partagée également en d . Le troisieme costé $a d$ est commun à tous les deux triangles: ainsi les trois costez de l'un sont égaux aux trois costez de l'autre, & par consequent tout le triangle $a d c$ est égal à tout le triangle $a d b$, & l'angle c à l'angle b ; (2.13.) ce qu'il falloit démontrer.

16. Dans tout triangle Ifoſcele, la ligne qui tombant de l'angle du ſommet partage la baſe en deux également, eſt perpendiculaire à la meſme baſe, & diviſe l'angle du ſommet auſſi en deux également: car l'angle $a d c$ eſt égal à l'angle $a b d$ par la précédente: & par conſequent ils ſont tous deux droits, & la ligne $a d$ perpendiculaire ſur $b c$, (1.15.) & de meſme l'angle $d a c$ eſt égal à l'angle $d a b$ par la précédente.

17. En tout triangle le plus grand costé ſoutient ou ſoutient (ſubtendit) le plus grand angle, c'eſt à dire, eſt oppoſé au

plus grand angle. Soit le costé $b c$ plus grand que le costé $a c$.




je dis que l'angle a soustenu par le costé $b c$ est plus grand que l'angle b soustenu par le costé $a c$: car puisque $b c$ est plus grand que $a c$, soit imaginée $c d$ égale à $a c$, afin que $a d c$ soit un triangle isoscele : donc (2. 15.) l'angle $c a d$ sera égal à l'angle $c d a$. Or l'angle $c a b$ est plus grand que l'angle $c a d$: comme (*le tout est plus grand que sa partie*) Donc l'angle $c a b$ est plus grand que l'angle $c d a$. De plus, cet angle $c d a$ estant externe à l'égard du petit triangle $d a b$, cet angle, dis-je, $c d a$ sera plus grand que le seul interne b : (2. 10.) Donc, à plus forte raison, l'angle $c a b$ sera plus grand que l'angle b : ce qu'il falloit prouver.

18. Tout triangle doit avoir necessairement deux angles aigus : car s'il n'en avoit qu'un, les deux autres seroient ou deux obtus, ou deux droits, ou l'un obtus, & l'autre droit. Or rien de tout cela ne peut estre, puisque (2. 9.) tous les trois angles ensemble ne valent que deux droits.


19. De toutes les lignes qu'on puisse tirer d'un point donné à une ligne donnée, la plus courte est la perpendiculaire, & les plus longues sont celles qui s'éloi-

gnent le plus de la perpendiculaire. Soit donnée la ligne ad , & le point donné b ; soit de plus ba perpendiculaire à da , de laquelle be soit plus éloignée que ne l'est bc : je dis que ba est



plus courte que toute autre ligne possible, par exemple, plus courte que bc & davantage, que be est plus longue que bc . Car dans le triangle abc l'angle a est droit, & par conséquent le plus grand de tous, puisque les deux autres doivent nécessairement estre aigus: (2. 18.) Donc le costé bc est plus grand que ba , (2. 17.) comme soutenant le plus grand angle. De mesme dans le triangle bce l'angle bce est obtus, puisque l'angle bca est aigu, & par conséquent le costé be sera plus grand que bc , (2. 17.) comme soutenant le plus grand angle.


20. En tout triangle deux costez pris ensemble sont plus longs que le troisiéme. Soit le triangle abc , je dis que le costé ab , plus ac , est plus long que le seul cb : car soit prolongé ba , & qu'on imagine ad égal à ac , le triangle adc sera Isoscèle, & par conséquent l'angle acd sera égal à l'angle d : (2. 15.) Donc l'angle acb , qui est plus grand






que l'angle dca , est aussi plus grand que l'angle dcb . Donc en considérant comme un seul triangle bdc , le côté bd sera plus grand que cb , (2.17.) comme soutenant un plus grand angle. Or bd est égal aux deux ba, ac , puisque ad est égal à ac : Donc les deux ba, ac , sont plus grands que bc ; ce qu'il falloit prouver.

21. Quoy-que cette proposition soit démontrée, elle peut néanmoins passer pour un principe naturellement connu. Car la ligne cb étant une ligne droite, elle fait aussi le plus court chemin depuis le point c jusqu'au point b , tandis que




les autres cab , ou bien cdb , ou ceb , prennent des détours, & par conséquent des chemins plus longs. Et même on peut avec Archimede poser pour principe, que des lignes qui font ainsi des circuits, celles-là sont plus longues, qui dans leur circuit renferment les autres, & qu'ainsi cdb est plus longue que ceb , & cab que cdb ; pourveu néanmoins que ces lignes ne rentrent point comme en cette figure, où les lignes $effb$ peuvent estre plus longues que cab , quoy-que elles soient renfermées dans le circuit de cab .




LIVRE TROISIÈME.

Des Quadrilateres, & des Poly-
gones.

LEs figures comprises entre quatre lignes droites, qui font quatre angles, sont appellées *Quadrilateres*.

1. Quand les lignes opposées sont parallèles, le *Quadrilatere* s'appelle *Parallelogramme*, *a*; sinon il s'appelle simplement *Trapeze*, *b*. 

3. Quand le parallelogramme a tous les quatre angles droits, il s'appelle *Parallelogramme Rectangle*, *c*, ou,  pour abreger, simplement *Rectangle*: & si de plus tous les costez sont égaux, il s'appelle *Quarré*, *d*.

4. Si tous les costez estant égaux, les angles néanmoins ne le sont pas; alors le parallelogramme s'appelle *Rombe*, ou *Losange*.

5. Si le parallelogramme n'a ni les angles, ni les costez égaux, il s'appelle *Rhomböide*, *a*.

6. Et en tout parallelogramme les angles opposés sont égaux. Soit le parallelo-

gramme $o b c d$, je dis que l'angle o est égal à l'angle c : car l'angle o est égal à l'angle extérieur b , (1. 31.) & b est égal à c : (1. 31.) donc o est égal à c .

7. La ligne tirée d'un angle à l'autre angle opposée, s'appelle *Diagonale* ou *Diamètre*, comme $b d$.

8. Tout parallélogramme est divisé en deux parties égales par la diagonale. La diagonale $b d$ divise le parallélogramme $o b c d$ en deux triangles $o b d$ & $b c d$. Il faut donc prouver que ces deux triangles sont égaux. 1. L'angle o est égal à l'angle c . (3. 6.) 2. L'angle $o b d$ est égal à l'angle $c d b$: (1. 31.) & par mesme raison aussi l'angle $o d b$ est égal à l'angle $c b d$. Ainsi ces deux triangles ont tous les trois angles égaux réciproquement, chaque angle de l'un à chaque angle de l'autre : & de plus, le costé $b d$ est commun à l'un & à l'autre triangle : Donc aussi tout le triangle $o b d$ est égal à tout le triangle $c d b$. (2. 14.)

9. En tout parallélogramme les costez opposez sont égaux, puisque le triangle $o b d$ est tout égal à tout le triangle $d o b$, par la précédente : aussi le costé $o d$ sera égal au costé $b o$, & le costé $o d$ au costé $b c$; ce qu'il falloit prouver.

10. Deux diagonales $a c$ & $b d$ se coupent

DE GEOMETRIE, LIV. III. 25

pent mutuellement par le milieu e : car dans les triangles $a e d$ & $b e c$, le costé $a d$ est égal au costé $c b$:

(3. 9.) l'angle $e a d$ est égal à l'angle $e c b$, (1. 31.)

& de mesme l'angle $a d e$

est égal à l'angle $c b e$; (1. 31.) & de plus l'angle $a e d$ est égal à l'angle $c e b$,

(1. 23.) puisqu'il luy est opposé par la pointe : Donc le costé $d e$ est égal au costé

$b e$, & le costé $a e$ au costé $c e$. (2. 14.)

Ainsi ces deux Diagonales sont divisées également en e .

11. Toute ligne droite $f g$, qui passe par le milieu de la diagonale e , partage le parallelogramme en deux également. Il faut prouver que

le trapeze, c'est à dire, le

quadrilatere irrégulier, $a f d$

$g d a$ est égal au trapeze

$c g f b c$. 1. Le triangle $b e f$ est égal au

triangle $d e g$: car le costé $d e$ est égal

à $e b$ par l'hypothese ; l'angle $d f e$ est

égal à l'angle $d e g$; (1. 31.) l'angle $e n$

e est égal de part & d'autre, puisqu'il

est opposé par la pointe, &c. Donc le

triangle $f e b$ est égal au triangle $g e d$.


(2. 14.) 2. Tout le triangle $a d b$ est égal


au tout $c b d$: (3. 8.) Donc, si du triangle

$a d b$ on oste le petit triangle $f e b$, &

qu'en récompense on luy donne le trian-

B





gle $d e g$, il se fera un trapeze $a f g d$ égal au triangle $a d b$, c'est à dire, à la moitié de tout le parallelogramme ; ce qu'il falloit prouver.

12. Si dans la diagonale $b d$ on prend un point e , par lequel passent deux pa-



ralleles aux costez, sçavoir $g e f$, & $h e i$; il se fera quatre parallelogrammes, sçavoir $e f b i$, $e h d g$; (& ces

deux s'appellent *Parallelogrammes d'autour du diametre*) & les deux autres parallelogrammes sont $e h a f$, & $e i c g$. & ces deux s'appellent *Complemens*: & les deux complemens avec un parallelogramme d'autour du diametre font la figure qu'on appelle *Gnomon* ou *Esquiere*, comme est icy ce qui est haché ou marqué par des traits.

13. En tout parallelogramme les *Complemens* sont égaux. Il faut prouver que $e h a f$ est égal à $e g c i$. Tout le triangle $b a d$ est égal au tout $b d c$: (3. 8.) de mesme le triangle $e f b$ est égal au triangle $e b i$, (3. 8.) & aussi $e h d$ est égal à $e g d$: (3. 8.) Donc si des deux triangles égaux $b d a$ & $b d c$, on oste choses égales, à sçavoir, si on oste d'une part $e f b$, & $e h d$, & de l'autre $e i b$, & $e g d$, il restera d'u-

ne part le parallelogramme $e b a f$ égal au parallelogramme $e i c g$, qui restera de l'autre part ; ce qu'il falloit prouver.


14. Les parallelogrammes qui ont une mesme base, & qui sont entre les mesmes paralleles, sont égaux. Soit un parallelogramme $a b d c$, & un autre $a b f e$. en sorte que la base $a b$ soit commune à tous les deux, & que la ligne $c d$ étant continuée, passe par a  $e f$; si-bien que ces deux parallelogrammes soient ainsi entre deux paralleles, & terminez par elles, à sçavoir, entre la ligne $a b$, & la ligne $c f$, parallele à $a b$: je dis que le parallelogramme $a b d c$ est égal à $a b f e$.
 1. $c d$ est égale à $e f$, puisque l'une & l'autre sont égales à $a b$: (3. 9.) Donc si à chacune de ces deux lignes égales nous ajoutons la ligne $d e$; $c e$ sera égale à $d f$. 2. $c a$ est égal à $d b$. (3. 9.)
 3. L'angle $a c e$ est égal à l'angle $b d f$: (1. 31.) Donc tout le triangle $a e c$ est égal au tout $b f d$. Donc si de chacun de ces deux triangles égaux, on oste le triangle blanc $d e o$ qui est entre les deux parallelogrammes, & qu'on leur ajoute aussi à chacun le triangle contrehaché, $o a b$; il résul-

B ij




tera de tout cela d'une part le parallelogramme $abdc$ égal au parallelogramme $aefb$, qui sera fait de l'autre part.

15. Les parallelogrammes qui sont entre les mesmes paralleles ab & cf , & sur des bases égales, l'un sur ab , & l'autre sur gh , en sorte que ab soit égal à gh , sont égaux. Car si l'on ima-



gine un troisiéme parallelogramme $aefb$, celui cy sera égal à $abdc$. (3. 14.) puisqu'il est sur la mesme base ab , & entre les mesmes paralleles ab & cf : & ce mesme parallelogramme $aefb$ est aussi égal à $ghfe$, puisque l'un & l'autre ont mesme base, sçavoir ef , (il n'importe de rien que la base soit au haut ou au bas) & qu'ils sont entre les mesmes paralleles, sçavoir entre fe & ha . Donc aussi $hfe g$ est égal à $abdc$, puisqu'ils sont égaux à un troisiéme $aefb$.

16. Les triangles qui sont sur mesme base ab , & entre mesmes paralleles ab & ce , sont égaux. Le triangle abc est égal au triangle abf , parce que si l'on imagine une ligne bd parallele à ac , & une autre bf parallele à ae ,



DE GEOMETRIE, LIV. III. 19

on aura deux parallelogrammes $a c d b$, & $a e f b$, lesquels estant sur mesme base $a b$, & entre mesmes paralleles, seront égaux. (3. 14.) Or le triangle $a c b$ est la moitié du parallelogramme $a c d b$, & le triangle $a e b$ est la moitié du parallelogramme $a e f b$: (3. 8.) Donc ces deux triangles sont égaux.

17. Les triangles sur bases égales, & entre mesmes paralleles, sont égaux. La preuve en est aisée.


18. Si un triangle a mesme base avec un parallelogramme, & est entre mesmes paralleles, il sera la moitié de ce parallelogramme. Le triangle $a b c$ est la moitié du parallelogramme $a e f b$.

19. Le *Pentagone* est une figure à cinq costez, & cinq angles. Si tous les costez sont égaux, & tous les angles aussi; le *Pentagone* est *Régulier*.

20. L'*Hexagone* est de six costez, & de six angles; l'*Heptagone* de sept; l'*Octogone* de huit, &c. qui sont aussi *Réguliers*, quand tous les angles & tous les costez sont égaux entre eux.

21. *Polygone* est généralement toute figure, qui est comprise sous plusieurs costez, & fait plusieurs angles: mais on ne se sert gueres de ce nom, si les figures n'ont plus de quatre, ou de cinq costez.

22. Tout polygone se peut diviser en autant de triangles qu'il a de costez. Si au dedans du polygone on prend un point *a* en quelque part que ce soit, & que de ce point on imagine des lignes tirées vers chaque angle *ab*, *ac*, *ad*, &c. il se fera autant de triangles, qu'il y a de costez dans le polygone.




23. Les angles des polygones sont tous ensemble deux fois autant d'angles droits, moins quatre, qu'il y a de costez. Par exemple, si le polygone a Sept costez, dont le double est 14. & si en ôtant quatre, il reste dix : je dis que tous les angles de cét heptagone, sçavoir l'angle *c b h*, plus *b h g*, plus *b g f*, &c. sont tous ensemble égaux à ces dix angles droits. Car si du point *a* on tire vers les angles sept lignes *a b*, *a c*, *a d*, &c. pour faire les sept triangles, chacun de ces triangles aura trois angles, qui en valent deux droits : (2. 9.) de sorte que tous les angles ensemble de tous ces sept triangles valent 14. droits. Or chacun de ces triangles a un angle, qui va aboutir au point *a* : en sorte qu'estant tous posez autour de ce point *a*, ils remplissent tout l'espace d'alentour : Donc tous ces angles aboutissant ainsi au point *a*, valent 4. droits (1. 22.) & par conséq.

DE GEOMETRIE, LIV. III. 31

quent tous les autres angles qui sont vers les angles de l'heptagone, valent dix droits; ce qu'il falloit prouver.

24. Le polygone se peut aussi diviser en triangles, en tirant des lignes d'angle à angle; alors le nombre des costez surpassera de deux celui des triangles.





LIVRE QUATRIÈME.

Du Cercle.

1. **U**N E ligne est dite *Toucher* un cercle, quand elle le touche sans qu'elle entre dedans, quoy-qu'elle soit prolongée au-delà du point *a* d'attouchement. La ligne *a* touche


 icy le cercle *c*, comme aussi le cercle *c* touche le cercle *d* : mais en *b* la ligne entre dans le cercle, & le coupe.

2. Une ligne entrant dans un cercle, le coupe en deux parts, qu'on ap-

 pelle *Segmens*. *e* est le *petit* segment, & *f* est le *grand* : & cette ligne qui coupe, s'appelle *Corde*, & les parties du cercle coupées s'appellent *Arcs*. La corde avec l'arc fait aux deux bouts deux angles mixtes, qu'on appelle *Angles du Segment*, comme *e b f*.

3. Si dans l'arc du segment $a c b$ on prend un point c en quelque part que ce soit, & que l'on imagine deux lignes $c a$, $c b$;  elles feront un angle $a c b$, qui s'appelle l'angle dans le segment: & on dit que cet angle $a c b$ insiste sur l'arc de l'autre segment d'embas.


4. Secteur du cercle est un triangle mixte compris entre deux demi-diametres $a b$, $a c$, & un arc du cercle $b c$. Le secteur est icy marqué par des traits. 

5. Si par l'extrémité d'un demi-diametre $a b$, on imagine une perpendiculaire $b d$, elle touchera le cercle en ce seul point b ; & tout autre point imaginable de la ligne $b d$ sera hors le cercle. Par exemple, le point d est dehors; car si on imagine une ligne tirée du centre $a d$, laquelle coupe le cercle au point c , cette ligne $a d$ sera plus longue que $a b$, (2. 19.) & par consequent plus longue que $a c$, puisque $a c$ est égale à $a b$: (1. 14.) Donc le point d tombe au-delà du cercle. Ce qu'il falloit démontrer. 

6. Une corde $b c$ est divisée en deux

B v

également par une perpendiculaire ad , tirée du centre a : car le triangle abc est isoscele, puisque ab est égal à ac : (1. 14.) donc la perpendiculaire ad coupe la base bc en deux également. (2. 16.) L'arc bc est aussi divisé également.



7. Si deux lignes db & dc touchent un cercle, elles seront égales. Car imaginant du centre vers les points d'attachement deux lignes ab & ac , celles-cy seront perpendiculaires aux touchantes. (4. 5.) De plus, si on imagine la ligne bc , l'angle abc sera égal à l'angle acb : (2. 15.) donc si de choses égales, c'est-à-dire,




des angles droits abd & acd , on oste les choses égales, c'est-à-dire, l'angle abc , d'une part, & de l'autre l'angle acb , les angles qui resteront seront égaux, c'est-à-dire, cbd sera égal à bcd , & par conséquent le costé db sera égal au costé dc . (2. 15.)




8. Deux cordes égales bc , ef , font deux segmens bdc & egf égaux, & les perpendiculaires ao & an seront égales. Cecy est facile à prouver.

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 35


9. Soit le demi-diametre $a b$, la perpendiculaire $b d$, une autre ligne $a c d$ coupant le cercle en c , & la perpendiculaire en d , une autre ligne $e e$ perpendiculaire au rayon $a b$: toutes ces lignes ont des noms affectez. La ligne $b d$ terminée ainsi par $a d$, s'appelle *Tangente* de l'arc $b c$, par exemple de 30. degrez; la ligne $a d$ s'appelle *Secante* du mesme arc de 30. degrez; la ligne $e e$ s'appelle le *Sinus* du mesme arc; & enfin $a b$, s'appelle le *Sinus-total*, ou simplement le rayon.




10. Si dans une circonference d'un cercle on prend deux points a & b , desquels on tire deux lignes jusques au centre c , & deux autres jusques à un autre point d de la circonference; il se fait deux angles, dont l'un $a c b$ s'appelle *Angle au centre*, & l'autre $a d b$, *Angle à la circonference*.



11. L'angle au centre $a c b$ est toujours double de l'angle à la circonference $a d b$. 1. Si l'une des lignes, comme $b d$, passe par le centre c , l'angle $a c b$ sera externe à l'égard du triangle $a c d$:



(2. 10.) & par conséquent il sera égal aux deux angles internes opposez, sçavoir à l'angle $a d c$, plus à l'angle $d a c$: (2. 10.) Or ces deux angles $a d c$ & $d a c$ sont égaux (2. 15.) puisque les deux jambes $c a$ & $c d$ sont égales : (1. 14.) Donc l'angle $a c b$ est double d'un de ces deux,



sçavoir de $a d c$; ce qu'il falloit prouver. 2. Si aucune des lignes $a d$ ou $e b d$, ne passe par le centre c ; soit imaginé $d c e$, en sorte que e se trouve hors l'arc $a b$: alors tout l'angle $a c e$ sera double de l'angle $a d e$, par ce que je viens de montrer dans la première partie de cette proposition; & de même l'angle $b c e$ est double de l'angle $b d e$: Donc si de l'angle $a c e$ on ôte $b c e$, & que l'angle $a d e$, (qui est la moitié de $a c e$) on ôte $b d e$, (qui est aussi la moitié de $b c e$) ce qui restera $a d b$ sera la moitié de $a c b$: parce que c'est une maxime,




que si une quantité est double d'une autre, & qu'on ôte de la grande le double de ce qu'on ôte de la petite, ce qui restera de la grande sera encore double de ce qui restera de la petite. 3. Si le


DE GEOMETRIE, LIV. IV. 37

point e tombe dans l'arc ab , alors l'angle ace sera double de l'angle ade : & l'angle bce sera aussi double de bde , parce que a esté démontré dans la premiere partie de cette proposition : Donc l'angle total acb est double de adb .


12. Tous les angles qui insistent sur un mesme arc ab sont égaux, en quelque part de la circonference que leur pointe aboutisse. L'angle acb est égal à l'angle aeb , parce que l'un & l'autre est la moitié de l'angle acb , qui se feroit au centre c . (4. 11)




13. L'angle au centre ace , insistant sur la moitié de l'arc ab , sur lequel insiste un autre angle à la circonference adb , est égal à ce mesme angle de la circonference. (4. 11.)




14. L'angle adb , qui insiste sur la demi - circonference, est droit ; car si e partage en deux la demi - circonference aeb , l'angle ace sera égal à l'angle adb par la précédente. Or ace est droit : (1. 15.) Donc aussi adb est droit.



15. L'angle $a d b$, dans le petit seg-




ment, est obtus, parce que l'arc $a e b$ étant plus de la moitié de la circonférence, l'arc $b e$, qui est la moitié de l'arc $a e b$, aura plus de 90. degrez. Ainsi l'angle $a d b$, qui est égal à l'angle $b c e$, (4. 13.) fera de plus de 90. degrez ; c'est-à-dire, il sera obtus.



16. L'angle $a d b$ dans le grand segment est aigu : car il est égal à l'angle $a c e$. Or l'arc $a e b$ étant moindre que la demi-circonférence, l'arc $a e$, qui est la moitié de $a e b$, aura moins de 90. degrez.

17. Si une droite $g a b$ touche le




cercle à un point a , & qu'une autre ligne $a e$ coupe le même cercle, l'angle $b a e$ sera égal à l'angle dans le segment opposé $a h e$: & l'angle $e a g$ sera égal à l'angle dans l'autre segment $a f e$. Car soit imaginée la perpendiculaire $a d$, qui passera par le centre e , (4. 5.) l'angle $a e d$ sera droit : (4. 14.) & par conséquent, puisque les trois angles d'un

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 39

triangle sont égaux à deux droits, (2. 9.) l'angle $e a d$ avec l'angle $a d e$ fera un droit. Or ce même angle $e a d$ avec $e a b$ fait aussi un droit, puisque $a d$ est perpendiculaire à $a b$: Donc l'angle $e a b$ est égal à l'angle $a d e$, & par conséquent à tout autre angle qui insistera sur le même arc $a e$, & qui aboutira à quelque autre point de la circonférence, comme à l'angle $e h$, puisque tous ces angles sont égaux entre eux; (4. 12.) & c'est la première partie de cette proposition. Maintenant il faut prouver que l'angle $e a g a$, est égal à l'angle $a f e$; ce qui est l'autre partie. Dans le triangle $a e f$, l'angle $a f e$ avec $f a e$ & $f e a$, est égal à deux droits. (2. 9.) Or l'angle $f e a$ est égal à $f a b$, par ce qui vient d'être prouvé dans la première partie de cette proposition, car la ligne $f a$ peut être considérée comme coupant le cercle & la tangente $b a$, auquel cas l'angle $f a b$ doit être égal à tout autre angle qui seroit fait dans le segment opposé $f d h a$. Or l'angle $f e a$ est fait dans ce segment, parce qu'il insiste sur l'arc $f a$, & que sa pointe e aboutit à un point de la circonférence $f e d h a$, ainsi cet angle $f e a$, est égal à l'angle $f a b$. Donc les deux angles

eaf & fab , avec afe , sont égaux à deux droits. Mais les mêmes eaf & fab , avec $ea g$ sont aussi égaux à deux droits : (1. 20.) Donc l'angle $ea g$ est égal à l'angle efa ; ce qu'il falloit prouver.

18. Une figure rectiligne est dite *circonscrite* à un cercle, quand tous les costez de cette figure touchent le cercle sans le couper. Le triangle acd est circonscrit au



cercle $b g f$, parce que chaque costé de ce triangle touche le cercle en b , en g , & en f .

19. Une figure est *inscrite* au cercle, quand tous les angles aboutissent à la circonference, comme le triangle abc de la figure suivante.



20. Tout triangle abc peut estre inscrit dans un cercle : car si l'on imagine deux lignes ei , & eh qui coupent perpendiculairement, & par le milieu les costez ab & bc , on pourra tirer un cercle du point e comme du centre par le point b . Or je dis que ce cercle passera par les points a & c : car 1. les deux trian-

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 41

gle eib & eia seront tous égaux, puisque le costé ib est égal au costé ia par l'hypothese, le costé ei est commun, l'angle vers i est droit de part & d'autre: Donc (2. 11.) le costé eb est égal au costé ea . 2. Par mesme raison on prouvera que le costé ec est égal à eb : & par consequent le cercle, dont le centre seroit e , & le demi-diametre eb , passeroit par a & par c .

21. Tout triangle acd (fg. de l'art. 18.) peut estre circonscrit à un cercle. Car si l'on imagine deux lignes ae , & de , qui divisent en deux également les angles a & d ; & puis des perpendiculaires sur les costez du triangle, sçavoir eb , ef , eg : je dis que si on tire un cercle du centre e par b , ce cercle touchera les trois costez du triangle aux points b , f , g . Car .1. les deux triangles aeb , aef sont tout égaux: car ils ont un costé ae commun, un angle vers b & f droit, un autre angle vers a égal, puisque l'angle baf a esté divisé en deux également: Donc le costé eb est égal au costé ef . (2. 14.) 2. Par mesme raison on prouvera que eg est égal à ef . Et comme d'ailleurs ces lignes eb , ef , eg sont perpendiculaires sur les costez du triangle, le cercle

b f g touchera ces costez en ces points.
(4. 5.)

22. Tout quadrilatre *a f e d* inscrit dans un cercle, a les angles opposez égaux ensemble à deux droits. Car si par le point *a* on tire une tangente *g a b*, & une diagonale *a e*, l'angle *a f e* sera égal à l'angle *e a g*, (4. 17.) & l'angle *a d e* à l'angle



e a b : (4. 17.) & par conséquent, puis que les deux *f e a b* & *e a g* sont égaux à deux droits, ces deux angles opposez *f* & *d* sont aussi égaux à deux droits. De même maniere on prouvera que les angles *f e d*, & *f a d* seront égaux à deux droits, si l'on imagine une autre tangente par le point *f*.

23. La converse de cette proposition est aussi manifeste; sçavoir, que tout quadrilatre, dont les angles opposez sont égaux à deux droits, est inscrit dans un cercle; c'est à dire, qu'il peut y avoir un cercle qui touche tous ses quatre angles.

24. Tout polygone circonscrit à un cercle est égal à un triangle rectangle, dont une jambe seroit égale au demi - diamètre du cercle, & l'autre à toute la circonference du polygone. Soit

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 43
la ligne FA égale au demi-diametre fh ,
& la perpendiculaire infinie $ABCD$, &c.
sur laquelle soit prise Ah égale à ah , &
 hB égale à hb , & Bi égale à bi , &
 iC égale à ic , &c.



afin que toute la ligne $AB C D E A$
soit égale à toute la circonference du
polygone $a b c d e a$. De plus soit
 FF parallele à AB , afin que toutes
les perpendiculaires hF , iF , kF , &c.
soient égales au demi-diametre fh ou
 fi , &c. il est clair que le triangle
 AFB sera égal au triangle afb ,
& le triangle BFC au triangle bfc ,
& CFD à $cf d$, &c. Ainsi tous ces
triangles ensemble seront égaux à tout
le polygone. Or le triangle FAA
est égal à tous ces triangles ensemble,
à cause qu'en tirant les lignes BF , CF ,
 DF , &c. Le triangle FAB sera égal
à FAB , & FBC à FBC , &c.
(3. 16.) Donc aussi tout le triangle
 FAA est égal au polygone; ce qu'il
falloit démontrer.

25. Tout polygone régulier est égal



à un triangle rectangle, dont une jambe seroit toute la circonference du polygone, & l'autre, la perpendiculaire tirée du centre sur un des costez du

polygone. La preuve en est la mesme que celle de la proposition précédente. Car routes les perpendiculaires *fh*, *fi*, *fk*, &c. sont égales, &c.

26. Tout polygone circonscrit est plus grand que le cercle, & tout polygone inscrit est plus petit. Cela est manifeste, parce que ce qui contient est plus grand que ce qui est contenu.

27. Le perimetre (ou la circonference) de tout polygone circonscrit est plus grand que la circonference du cercle, & le perimetre de tout polygone inscrit est plus petit: cela est aussi manifeste par la 21. du second livre.

28. Si dans un petit segment de cercle *abc*, on inscrit un triangle isoscele, en sorte que *ab* soit égal à *bc*;




e b d ce triangle sera plus grand que la moitié du segment. Car si on tire la tangente *e b d*, qui sera parallele à *ac*, car elle est perpendiculaire à *fb*, (4. 5.)

à laquelle l'est aussi *ac*; (4. 6.) & si

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 45


de plus on acheve le parallelogramme rectangle $a e d c$; celui - cy sera plus grand que le segment du cercle $a b c$. Or le triangle $a b c$ est la moitié du parallelogramme $a e d c$: (3. 18.) Donc ce triangle $a b c$ est plus grand que la moitié du segment $a b c$.

29. Soit la tangente $a d b$, & la secante $f c b$, & la droite $a c$, & une autre tangente $c d$; je dis que le triangle $d b c$ est plus de la moitié du triangle mixte, compris entre les droites $a b$, $c b$, & la circulaire $c a$: car dans le triangle $d b c$ l'angle en c estant droit, (4. 5.) le costé $d b$ sera plus grand que $d c$. (2. 17.) Or $d c$ est égal à $d a$: (4. 7.) Donc $d b$ est plus grand que $d a$: Donc le triangle $c b d$ est plus grand que le triangle $c a d$: (3. 17.) Donc il est plus grand que la moitié du triangle total $c b a$. Or ce triangle $c b a$ est plus grand que le triangle mixte compris entre l'arc $a c$, & les droites $b c$, $b a$: Donc aussi le triangle $d b c$ est plus grand que la moitié du triangle mixte $a b c$.



30. De ces deux propositions il s'enfuit, qu'en multipliant les costez des

polygones réguliers, on en peut faire de circonscrits & d'inscrits, en sorte que la difference, dont le circonscrit surpassera le cercle, ou dont le cercle surpassera l'inscrit, soit aussi petite que l'on voudra; parce que si de quelque quantité que ce soit, on oste plus de la moitié, & du *résidu* encore plus de la moitié, & derechef plus de la moitié encore du résidu, & ainsi plusieurs



fois, on viendra enfin à laisser un résidu aussi petit que l'on voudra: ce qui est naturellement connu. Ainsi, après avoir inscrit un triangle, qui sera plus petit que le cercle de trois grands segmens, on peut inscrire un hexagone, qui sera plus grand que n'estoit le triangle; mais qui sera encore plus petit que le cercle de six petits segmens qui sont icy blancs. Or ces six petits segmens tous ensemble ne contiennent pas tant d'espace, que la moitié des trois premiers segmens. (4. 28.) Après quoy on peut encore inscrire un dodécagone, qui sera surpassé par le cercle de douze petits segmens: mais tous ces douze ensemble ne vaudront pas la moitié des six segmens de l'hexagone; & ainsi on peut, en multipliant les costez des polygones,

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 47

diminuer tant que l'on voudra la difference dont le cercle surpassera ce polygone inscrit. De mesme, après avoir circonscrit un triangle, on peut circonscrire un hexagone, & puis un dodécagone, & une figure de vingt-quatre costez, &c.

31. Tout cercle est égal à un triangle rectangle, dont une jambe est le demi-diametre, & l'autre une ligne droite égale à la circonference du cercle. Car ce triangle sera plus grand que tout polygone inscrit, & plus petit que tout polygone circonscrit : (par la 24. 25. 26. & 27. du 4.) Donc il sera égal au cercle. Car s'il estoit plus grand, pour petite qu'en fust la difference, on pourroit faire un polygone circonscrit, dont la difference avec le cercle seroit moindre que la difference du mesme cercle avec ce triangle rectangle : ainsi ce polygone circonscrit seroit plus petit que ce triangle ; ce qui est absurde. De mesme, si ce triangle estoit plus petit que le cercle, on pourroit faire un polygone inscrit, qui seroit plus grand que ce triangle ; ce qui est impossible.

Cette sorte de démonstration que nous venons d'employer, & qu'on appelle de l'impossible, est une des plus belles inventions de l'antiquité ; & toute la Geo-


métric des indivisibles est fondée là - dessus : de sorte qu'il y a sujet de s'étonner, que quelques nouveaux Auteurs l'aient rejetée comme défectueuse & indirecte. Que si l'on en vient à ce point de délicatesse, que de ne pouvoir souffrir une démonstration, si elle ne prouve directement & positivement ; il sera fort aisé de donner à celle-cy un tour qui la rende régulière & directe : car on n'a qu'à poser pour principe, que si deux quantitez déterminées a & b sont telles, que toute autre quantité imaginable, qui seroit plus grande ou plus petite que b , seroit aussi plus grande ou plus petite que a , ces deux quantitez a & b sont égales. Et ce principe posé, qui est en effet très-manifeste de soy-mesme, on prouvera directement que ce triangle est égal au cercle, puisque toute figure imaginable (inscrite) plus petite que le cercle, est aussi plus petite que le triangle ; & que toute figure (circonscrite) plus grande que le cercle, est aussi plus grande que le triangle.

C'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle, qui ne consiste qu'à faire un quarré, ou bien un triangle, ou une autre figure rectiligne égale au cercle ; ce qu'on feroit, si l'on pouvoit trouver une ligne droite égale à la circonference, comme

DE GEOMETRIE, LIV. IV. 49

me il paroist en cette proposition; mais cette égalité n'a jamais esté trouvée géométriquement.

32. Une ligne estant disposée en cercle, tiendra plus d'espace qu'en toute autre figure polygone régulière que ce soit. Si la circonference du cercle $a b c d$ se dispose en quarré, ou en quelque autre polygone régulier, en sorte que tous les costez $e g$, $g h$, $h i$, $i e$, ensemble soient égaux à la circonference $a b c d$; je dis que tout ce cercle sera plus grand que le polygone. Car le cercle est égal au triangle, dont un costé est la circonference, & l'autre costé est le demi-diametre $f a$; & le polygone est égal au triangle, dont un costé est aussi la même circonference $a b c d$, ou les costez $e g h i$, & l'autre costé est $f o$, (4. 25.) Et comme $f o$ est plus petit que $f a$, tout ce second triangle égal au polygone sera plus petit que le premier triangle égal au cercle: & par conséquent ce polygone sera plus petit que le cercle; ce qu'il falloit prouver.



C'est ce qu'on entend, quand on dit communément, que de toutes les figures Isoperimetres, ou qui ont les circonferences égales; la plus grande est le cercle.

C



LIVRE CINQUIE'ME.

Des Solides.


1. **U**N ligne droite est dite simplement *droite* sur un plan, ou *érigée* sur un plan à *angles droits*, lors qu'elle n'est point inclinée sur ce plan plus d'un costé que d'un autre, comme une colonne sur le pavé.

2. Deux plans sont parallèles, quand toutes les perpendiculaires ou droites, tirées entre les deux plans, sont égales.

3. Un plan est perpendiculaire ou *droit* sur un autre plan, quand il n'est pas incliné ou panché plus d'un costé que d'un autre, comme une muraille sur le sol.

4. L'*angle solide* se fait, quand trois ou plusieurs plans se joignent en aboutissant à un point, comme la pointe d'un diamant bien taillé.

5. Si l'on imagine la ligne *a b* fixe au point *a*, & qu'elle soit meüe tout le long des costez d'un polygone *b c d*, cette ligne par ce mouvement décrira une figure qui s'appelle *Pyramide*.




DE GEOMETRIE, LIV. V. 35


6. Le polygone s'appelle la *base* de la pyramide.

7. Si la ligne ab se meut le long d'un cercle bcd , elle décrit un *Cone*, dont ce cercle est la *base*; & la ligne tirée de la pointe

au centre du cercle e est l'*axe*.



8. Si la ligne ab se meut uniformément autour de deux polygones bcd , afg , qui soient tout-à-fait égaux, ayant leurs costez & leurs angles égaux mutuellement, & que ces polygones soient paral-



leles, en sorte que les costez égaux se répondent parallèlement, af à bc , fg à cd , &c. Alors cette ligne par son mouvement fera une figure qui s'appelle *Prisme*; & les polygones en sont les *bases*.]

9. Si les bases du prisme sont des parallélogrammes, il s'appelle *Parallélepède*.

10. Si la ligne ab se meut uniformément autour de deux cercles égaux & parallèles, elle décrit un *Cylindre*.



E L E M E N S



11. La ligne qui joint les centres $e e$ des bases, est l'axe du Cylindre.

12. Dans toutes ces figures, lors que l'axe est perpendiculaire sur la base $d e c$, les figures sont appellées *Isoceles*; mais si l'axe est incliné, elles sont *Scalenes*.



13. Si un demi-cercle $a d b$ tourne autour de son diamètre $a b$, il décrit une *Sphere* ou un globe, dont l'axe est $a b$: le centre c , le mesme que celui du demi-cercle.


Toute ligne tirée par le centre c , & terminée de part & d'autre par la surface de la sphere, s'appelle *Diametre*, & peut estre dite *Axe*.

14. Toutes lignes tirées du centre c à la circonference, s'appellent *Rayons*, & sont égales entre elles.

15. Deux lignes droites qui se touchent en se croisant, sont en mesme plan, & par consequent tout triangle est aussi en mesme plan.

16. Si deux plans $e d b$, & $d a b$ se coupent, ils se coupent en une ligne droite $d b$, qui s'appelle la *commune section*.

17. Si une ligne cd est perpendiculaire à deux lignes fd & gd , qui sont dans le plan fgd , elle sera aussi perpendiculaire au plan.




18. Si une ligne cd est perpendiculaire à trois fd , gd , ad , ces trois lignes sont en même plan.

19. Si deux lignes dc , bi sont perpendiculaires au même plan fdb , elles seront parallèles.


20. Si deux lignes dc , bi sont parallèles, & qu'on tire quelque autre ligne droite de quelque point que ce soit d'une ligne à l'autre, comme db , ces trois lignes seront en même plan.

21. Si deux lignes dc , bi sont parallèles à une troisième ak , encore qu'elles ne soient pas en un même plan, elles sont parallèles entre elles.

22. Si une même ligne ab est perpendiculaire à deux plans cd & ef , ils sont parallèles.



23. Si deux plans parallèles dhg , afe sont coupez par un troisième i , les communes sections hg , fe seront parallèles.



C ij

28. Tout parallelepipedé est partagé en deux prismes triangulaires égaux par le plan qui passe par les deux diametres paralleles des deux faces opposées.

29. Les prismes triangulaires qui sont sur des bases égales, & entre les mesmes paralleles, sont égaux.

30. Les pyramides qui sont sur des bases égales, & entre les mesmes paralleles, sont égales.

31. Tous prismes généralement, tous cylindres, & tous cones qui sont sur des bases égales, & entre les mesmes paralleles, sont égaux.

32. Les pyramides & les cones qui sont sur des bases égales aux bases des prismes & des cylindres, & qui sont entre les mesmes paralleles, sont le tiers de ces prismes ou de ces cylindres.

33. Toute la sphere est égale à un cone, dont l'axe perpendiculaire est le demi-diametre de la sphere, & la base est un plan égal à toute la circonference convexe de la mesme sphere.

34. De toutes les figures solides que peut renfermer une mesme surface, la plus grande est la spherique.

35. *Corps régulier* est celui qui est compris entre des figures régulières & égales, duquel aussi tous les angles solides sont égaux; comme sont . . .

36. Le *Tetraédre* compris sous quatre triangles égaux & équilatéraux, c'est une pyramide, dont la base est égale à chaque face.

37. L'*Hexaédre* ou *Cube* composé de six quarez égaux, comme un dé à jouer.

38. L'*Octaédre* est de huit triangles égaux & équilatéraux.

39. Le *Dodecaédre*, de douze pentagones égaux & équilatéraux.

40. L'*Icosaédre* de vingt triangles égaux & équilatéraux.

41. Outre ces cinq corps réguliers, il n'est pas possible d'en trouver d'autres ; ce qu'on démontre ainsi.

On prend des triangles équilatéraux, qui sont les figures les plus simples de toutes les rectilignes. Il en faut pour le moins trois, pour faire un angle solide ; or ayant joint trois de ces triangles pour en faire un angle, on trouve justement le *tetraédre* : car ces trois triangles aboutissant en un point, laissent une base triangulaire semblable & égale aux faces, comme l'on voit dans la seule composition.

Joignant quatre de ces triangles, on fait l'angle de l'*Octaédre*.

Avec cinq de ces triangles on fait l'angle de l'*Icosaédre*.

Six de ces triangles joints ensemble ne


DE GEOMETRIE, LIV. V. 57


peuvent point faire d'angle solide, car ils sont égaux à quatre droits : Or tout angle solide est fait par des angles plans, qui tous ensemble doivent estre moindres que quatre droits : (5. 25.) ainsi il n'est pas possible de faire avec des triangles d'autres corps réguliers que ces trois.

Prenant maintenant des quarrez, & en joignant trois ensemble, on aura l'angle du cube ; & on ne sçauroit faire d'autre corps que le cube avec des quarrez, parce que si l'on prenoit quatre quarrez, & qu'on les joignist ensemble, on ne feroit plus un angle solide, mais un seul plan. (5. 25.)

Prenant trois pentagones, on fera l'angle du dodecaédre : mais quatre pentagones ne peuvent faire un angle solide.

Enfin trois hexagones joints ensemble remplissant tous les quatre angles droits, ne peuvent faire d'angle solide, & trois heptagones, ou d'autres figures de plus de costez le pourroient faire encore moins : ainsi en tout on ne peut faire que ces cinq corps réguliers, trois avec des triangles, un avec des quarrez, & un avec des pentagones.





LIVRE SIXIÈME.

Des proportions.

1. **Q**UAND on parle de *Grandeur*, & qu'on dit qu'une quantité est *grande*, on fait toujours quelque comparaison de cette quantité avec quelque autre de même nature, à l'égard de laquelle elle est dite *grande*. Ainsi nous disons d'une montagne, qu'elle est petite, & d'un diamant qu'il est grand, parce que nous comparons cette montagne avec les autres montagnes, en comparaison desquelles elle est *petite* : & que de même nous comparons ce diamant avec les autres diamans, en comparaison desquels nous disons que celui - cy est *grand*.

2. Quand on considère ainsi une quantité en la comparant à une autre, pour voir quelle grandeur elle a en comparaison de cette autre ; la grandeur que l'on trouve qu'a cette quantité ainsi en comparaison de l'autre, s'appelle *Raison*, quoy - que pour se faire mieux entendre il falust dire *Comparaison*.

3. La quantité qu'on compare à une autre s'appelle l'*Antecedent*, & cette autre le *Consequent*.

4. Quand de plus on considere quatre quantitez , & qu'on les compare deux à deux a 4 avec b 2 , & c 6 avec d 3 ; si l'on trouve que a a autant de *grandeur* en comparaison de b , que c en a en comparaison de d : alors on dit que ces raisons sont égales ; c'est à dire , que la raison d' a à b est égale à la raison de c à d ; & que comme a a deux fois autant de grandeur que b ; c aussi a deux fois autant de grandeur que d .

5. Mais si l'on trouve que a 4 ait plus de grandeur en a b c d e comparaison de b 2 , que c 6 n'en a en comparaison de e 5 : par exemple , si l'on trouve que a 4 ayant deux fois autant de grandeur que b 2 , c 6 n'en a pas deux fois autant que e 5 ; alors on dit que ces raisons sont inégales , & qu' a a *plus grande raison* à b , que c à e ; de sorte qu'*avoir plus grande raison* n'est autre chose qu'avoir plus de grandeur en comparaison d'une seconde quantité , qu'une troisième n'en a en comparaison d'une quatrième.

6. L'égalité de raisons s'appelle *Proportion* ; & quand on trouve que de quatre quantitez , la premiere a autant de grandeur à raison de la seconde , que la troisième en a à raison de la quatrième , alors on dit que ces quatre quantitez sont *proportionnelles*.


Pour mieux faire comprendre tous les

mysteres des proportions , qui passent pour les plus difficiles de la Geometrie, comme ils en sont sans contredit les plus importants , je vas les expliquer par un exemple , qui tout seul rendra à mon avis fort intelligibles des choses qui d'ailleurs paroissent assez embarrassées.

7. Imaginons le cercle $b A d$ décrit par le mouvement de la ligne $a b$ autour du point a ; & de mesme soit le cercle $c A e$ décrit par le mouvement d'un point c qui se trouve dans la ligne $a c b$; imaginons derechef que cette mesme ligne $a c b$ tourne encore une autre fois, & se meut jusqu'en $a e d$; l'arc $b B d$ soit appelé B ; l'arc $c D e$ soit appelé D ; tout le cercle $b B A$ soit nommé A ; tout le cercle $c D A$ soit nommé A :

Maintenant si nous comparons d'une part tout le cercle A à l'arc B ; & de l'autre tout le cercle A à l'arc D , nous trouverons manifestement que le cercle A , a autant de grandeur à la raison de l'arc B , que le cercle A en a à raison de l'arc D ; & que si

B est la quatrième ou la sixième partie du cercle A , D aussi sera la quatrième ou la sixième partie du cercle A : ce qui s'enonce de la sorte, *comme A est à B ,*




DE GEOMETRIE, LIV. VI. 62
ainsi A est à D , & pour abreger, nous le
marquerons ainsi $A. B :: D. A$.

8. Si maintenant nous renversons com-
parant B à A , & D à A , nous trouverons
aussi manifestement que $B. A :: D. A$. de
sorte que supposé que $A. B :: A. D$, nous
tirons incontinent une conclusion qu'on
appelle *invertendo* : donc $B. A :: D. A$.

9. Que si nous faisons un échange en
comparant un antecédent avec l'autre an-
técédent, & de même un conséquent
avec l'autre conséquent, nous conclurons
alternando, donc $A. A :: B. D$. Et ce-
cy est bien manifeste : car si tout le cer-
cle A est double ou triple (ou en quel-
que autre raison que ce soit) du cercle
 A , l'arc B sera aussi double ou triple
(ou enfin en même raison) de l'arc D .
Cecy, dis-je, est manifeste, puisque les
deux cercles A & A sont décrits par le
mouvement de la ligne $a c b$, en sorte que
 b décrivant tout le cercle A , c décrit tout
le cercle A , & b décrivant l'arc B , c décrit
aussi l'arc D ; & cela par un commun mou-
vement circulaire, sinon que le point c se
mouvant plus lentement que le point b ,
il décrit aussi un cercle plus petit à propor-
tion de la lenteur : & de même lorsque le
point b aura décrit l'arc B , le point c au-
ra pareillement décrit l'arc D , qui sera
plus petit à proportion de sa lenteur.

E L E M E N S

10. Si nous comparons les differences des antecedens & des consequens avec les consequens ; par exemple, A moins B , avec B , & A moins D , avec D , nous trouverons encore qu'il y a proportion, & que A moins B . $B :: A$ moins D . D ; car il est bien manifeste que l'arc b




$A d$ (qui est A moins B) est à l'arc B , comme l'arc $c A e$ (qui est A moins D) est à l'arc D : & cecy s'appelle *Dividendo*.

11. Si nous joignons les antecedens avec les consequens, nous trouverons que A plus B . $B :: A$ plus D . D ; ce qui s'appelle *componendo*.

12. Que si nous concluons que A . A moins $B :: A$. A moins D , cela s'appellera *convertendo*.

13. Si nous prenons plusieurs quantitez qui soient proportionnelles deux à deux comme B . $f :: D$ i .



& f . $g :: i$. n , &c. alors nous pouvons conclure ; en prenant les premieres & les dernieres, que B . $g :: D$. n ; ce qui s'appelle *ex aquo ordonné*.

La proposition qui suit est un peu embarrassée, mais elle n'est pas d'importance, & on peut la laisser.

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 63

14. Mais si après avoir pris $f. g :: o. D$, c'est - à - dire, comme la penultième à la dernière dans le premier rang : : ainsi quelque autre quantité o à la première du second rang, on conclut : donc $B. g :: o. i$; c'est - à - dire, comme la première à la dernière dans le premier rang : ainsi cette autre quantité o à la penultième du second rang : alors cela s'appelle *ex aquo troublé*. Or cela se peut toujours conclure : car puisque $f. g$, ou bien $i. n :: o. D$. il sera aussi *alternando* & *invertendo* $o. i :: D. n$, ou bien : : $B. g$.

15. Si l'on prend B . autant de fois que D , par exemple, $3 B$ & $3 D$, nous concluons que $B. D :: 3 B. 3 D$. Et de même : : $10 B.$ à $10 D.$ ou bien : : $12 \frac{1}{2} B.$ à $12 \frac{1}{2} D$; & ainsi de quelque autre manière qu'on multiplie ces deux grandeurs $B.$ & $D.$ pourveu qu'on les multiplie également, il y aura toujours même raison entre ces grandeurs également multipliées, qu'entre ces grandeurs simples. Et ces grandeurs ainsi également multipliées s'appellent *Equimultiples* des simples $B.$ & $D.$, & l'on dit que les *Equimultiples* sont entre elles comme les simples.


16. Si l'on partage B en même façon que D , & qu'on prenne, par exemple, une quatrième partie de B , & une qua-

trième partie de D, ou bien une dixième de B, & une dixième de D, ou telle autre partie semblable ; ces parties auront même raison entre elles que les totales.

$$B. D :: \frac{1}{3} B. \frac{1}{3} D :: \frac{1}{10} B. \frac{1}{10} D. \text{ \&c.}$$


Tout cela est naturellement connu.

17. Multiplier une ligne par une autre



ligne, c'est faire un parallélogramme rectangle, qui ait pour les deux costez contigus ces deux lignes. Par exemple, on multiplie la ligne A par la ligne B, en faisant le rectangle $a b c d$, en sorte que $a b$ ou $c d$ soit égal à A, & $b d$, ou $a c$ soit égal à B.

18. Multiplier un rectangle, ou une autre surface par une ligne




surface par une ligne, c'est faire un parallélepède rectangle (5.9.) dont la base soit cette surface, & la hauteur perpendiculaire soit

cette ligne. Par exemple, on multiplie la surface $a b d c$ par la ligne E, en faisant le solide $a b f g h$, &c. en sorte que sa base soit la surface $a d$, & sa hauteur $a e$ ou $b f$, égale à E.

19. Pour bien concevoir ces multiplications, il faut imaginer deux lignes,

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 67
 comme si elles avoient quelque largeur, & diviser toute leur longueur en de petits quarrez, comme vous voyez en ces figures, où A est une ligne, ou plutôt une regle composée de trois petits quarrez, & B, est une autre regle composée de quatre petits quarrez de mesme largeur que les trois d'A. Maintenant donc multiplier A par B, ou B par A, c'est prendre la regle B autant de fois qu'il y a de quarrez dans A, ou bien prendre A autant de fois qu'il y a de quarrez en B; ce qui revient au mesme.




Ainsi B pris trois fois fait le premier rectangle, qui comprendra douze quarrez : & A pris quatre fois fera le second rectangle, qui comprendra aussi douze quarrez, & sera tout-à-fait égal au premier.


20. Il faut prendre garde que la mesme multiplication se fait encore, bien que dans la longueur de la ligne il ne se trouve point précisément un certain nombre de petits quarrez; mais que si dans A, par exemple, il y a trois quarrez, & que dans B il y en ait quatre & demy, ou quatre, & telle autre partie, ou tel autre excès qu'on voudra, marqué icy d; on n'a qu'à prendre B trois fois pour

multiplier B par A, & l'on aura le premier rectangle composé de douze quarez, & de trois de ces excès *d*. Et de mesme multipliant A par B, c'est-à-dire, prenant A quatre fois & demi, ou bien quatre fois avec tel excès *d*, on aura le second rectangle composé aussi de douze quarez & de trois *d*.

21. Que si l'on imagine que la ligne B se retressit de la moitié, en sorte que sa longueur demeurant toujours la mesme, il se trouve qu'elle ait huit petits quarez, (c'est-à-dire, que sa longueur soit huit fois aussi grande que sa largeur) il se trouvera aussi que retressissant de mesme la largeur d'A, il y aura dans A six petits quarez : de sorte que si l'on multiplie maintenant B par A, ou A par B, il se fera deux rectangles tout-à-fait égaux aux deux précédens. Car B pris six

B 

A 

6 

A 

8

fois, fait le premier rectangle composé de quarante-huit petits quarez ; & A pris huit fois, fait le second rectangle composé aussi de quarante-huit quarez : & ces quarante-huit quarez ne valent ni plus ni moins que les douze des rectangles précédens, parce qu'un de ces douze en vaut qua-

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 67

tre de ces quarante-huit, comme il paroist dans la figure mesme. Ainsi quelque petite largeur que l'on donne à ces lignes, quand on les retressiroit à l'infini, il est manifeste que les rectangles qu'elles feront estant multipliées l'une par l'autre, seront toujours les mesmes. De sorte que l'on peut prendre hardiment les lignes comme indivisibles, & les multiplier, en faisant d'elles un rectangle, puisque jamais la grandeur de ce rectangle ne varie, quelque petitesse que l'on donne à la largeur des lignes.

22. Il est fort aisé d'appliquer tout cecy à la multiplication des solides : mais au lieu de quarez, il faut imaginer des cubes : car si l'on pense une surface composée de douze cubes ; & d'un autre côté, si l'on pense de plus une ligne composée de deux cubes, on multipliera la surface douze par la ligne deux, en prenant cette mesme surface autant de fois qu'il y a de petits cubes dans la ligne, c'est-à-dire, deux fois, & alors il se fera un solide composé de vingt-quatre petits cubes.

23. De tout cecy il paroist que ces petits quarez & ces petits cubes sont dans la multiplication des lignes & des surfaces ce que les unitez sont dans la multiplication des nombres : car multiplier un

nombre par un autre, par exemple, 3 par 5, c'est prendre 3, autant de fois qu'il y a d'unités en 5, ou bien prendre 5, autant de fois qu'il y a d'unités en 3; ce qui produit quinze. Ainsi multiplier une ligne par une autre, c'est prendre une de ces lignes autant de fois qu'il y a de quarrés dans l'autre; & multiplier une surface par une ligne, c'est prendre cette surface autant de fois qu'il y a de cubes dans la ligne.



Dans un autre endroit on parlera des multiplications de surfaces par des surfaces, ou par des solides, d'où résultent des composez, qu'on appelle de plus de trois dimensions.

24. Toutes grandeurs se peuvent exprimer par des lignes: comme, si une grandeur est double ou triple d'une autre, ou en telle autre raison qu'on voudra, on n'a qu'à prendre deux lignes, dont l'une soit double ou triple de l'autre, ou en telle autre raison semblable à la raison des grandeurs. Ainsi pour exprimer deux temps, par exemple, une heure & deux heures, ou bien deux vitesses, dont l'une soit double de l'autre, je n'ay qu'à prendre deux lignes, *a* double de *b*, & je pourray dire qu'*a* représente deux heures, ou la grande vitesse, & *b* représente une heure, ou la petite


DE GEOMETRIE, LIV. VI.

vitesse, & agir sur ces deux lignes comme je ferois sur les heures, &c.

25. Pour connoître la proportion des rectangles, il faut connoître la raison de la longueur de l'un à la longueur de l'autre, & de plus la raison de la largeur de l'un à la largeur de l'autre: par exemple, pour connoître quelle raison a le rectangle ac au rectangle eg , il ne suffit pas de sçavoir que la longueur ab est triple de ih , mais de plus, il faut aussi sçavoir que ad est double de ef : car si l'on prend ai égal à ef , le rectangle bi sera triple du rectangle eg , puisque ab est triple de ih , & ai égal à ef . Et de plus, comme id est encore égal à ai , ou à ef , (puisque l'on suppose que ad est double de ai , ou de ef ,) le rectangle ic sera aussi triple du rectangle eg . Ainsi tout le rectangle ac est deux fois triple du rectangle eg , c'est-à-dire, sextuple, ou qu'il contient six fois le rectangle eg . Ce que j'ay dit de la raison double & triple des largeurs & des longueurs, se doit aussi entendre de toute autre raison que ce soit: car si ab est quadruple de ih , & ad triple de ef , le rectangle ac sera trois fois quadruple du rectan-




gle $e g$, c'est-à-dire, que $a c$ sera dodecuple de $e g$, ou le contiendra douze fois. Mais si $a b$ est dodecuple de $e h$, & que $e f$ soit triple de $a d$; alors il se fait une certaine compensation. Car si ayant égard aux seules largeurs $a b$ & $e h$, le rectangle $a c$ a de l'avantage, & égale l'autre douze fois; d'autre part



néanmoins il perd cet avantage dans les hauteurs $a d$ & $e f$ où le rectangle $e g$ doit égaler l'autre trois fois. Comparant donc l'avantage & le desavantage, le rectangle $a c$ étant d'une part douze fois aussi grand, & d'autre part trois fois aussi petit, reste qu'il soit seulement quatre fois aussi grand que $e g$.

26. C'est ce qu'on entend, lorsqu'on dit que les rectangles sont en *raison composée* de leurs costez: car si $a b$ est triple de $e h$, & $a d$ double de $e f$, le re-




ctangle $a c$ aura au rectangle $e g$ une raison composée du triple & du double; c'est-à-dire, qu'il sera deux fois triple, ou trois fois double, ou en un mot sextuple. De même si $a b$ est quadruple de $e h$, & $a d$ triple de $e f$, ce re-

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 71

l'angle $a c$ aura au rectangle $e g$ une raison composée du quadruple & du triple, en sorte qu'il sera trois fois quadruple, ou quatre fois triple, ou en un mot dodecuple. De mesme si $a b$ est dodecuple de $e h$, & $a d$ subtriple de $e f$, (c'est-à-dire, que $e f$ soit triple de $a d$) la raison du rectangle $a c$ au rectangle $e g$ sera composée de la raison dodecuple & de la raison subtriple, en sorte que $a c$ sera douze fois subtriple, ou subtriplement dodecuple, ou en un mot quadruple de $e g$.


Si l'on prend douze fois la troisième partie d'un escu, on fait quatre escus; de sorte que quatre escus sont douze fois subtriples d'un escu, c'est-à-dire, font douze fois la troisième partie d'un escu.

27. De là il paroist que si les cottez de deux rectangles sont réciproquement proportionnels, les rectangles sont égaux: car si $a b$ est double de $e h$, & que réciproquement $h g$ soit double de $b c$, ou bien si $a b$ est triple de $e h$, & $h g$ triple de $b c$, ou enfin si quelque raison qu'ait $a b$ à $e h$, $h g$ ait aussi cette mesme raison à $b c$, il est bien manifeste que d'autant que le rectangle $a c$ surpasse l'autre en longueur, d'autant aussi



est il surpassé en largeur. Ainsi la longueur compensant la largeur, l'un & l'autre est égal : d'où l'on tire cette proposition tres-importante.

28. S'il y a quatre grandeurs proportionnelles, ce qui provient de la multiplication des deux moyennes, est toujours égal à ce qui provient de la multiplication des deux extrêmes; comme si



$a b . e h :: h g . b c$, je dis qu'en multipliant les extrêmes $a b$, & $b c$, pour en faire le rectangle $a c$, & en multipliant les moyennes $e h$ & $h g$, pour

en faire le rectangle $e g$, ces deux rectangles $a c$ & $e g$ seront égaux. (6. 27.) Ce qui se fait par lignes & par rectangles, se fait aussi par quelque autre grandeur que ce soit, puisque toutes grandeurs se peuvent exprimer par lignes, & toutes multiplications de grandeurs par multiplications de lignes, c'est-à-dire, par des rectangles. (6. 24.)

29. Lorsque les rectangles ont leurs costez proportionnels, en sorte que $a b . e h :: a d . e f$, on dit alors que le rectangle $a c$ est au rectangle $e g$, en raison doublée de la raison de leurs costez : car la raison de $a c$ à $e g$, est composée de la raison de $a b$ à $e h$, & de la raison

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 73

fon de $a d$ à $e f$. (6. 26.) Or la raison de $a b$ à $e h$ est icy (par l'hypothese) la mesme que la raison de $a d$ à $e f$: ainsi pour avoir la raison du rectangle $a c$ au rectangle $e g$, il suffit de prendre deux fois la raison de $a b$ à $e h$. Par exemple, si $a b$ est double de $e h$, & $a d$ double de $e f$,

le rectangle $a c$ sera deux fois double, c'est-à-dire, quadruple du rectangle $e g$:



& si $a b$ est triple de $e h$, & $a d$ triple de $e f$; $a c$ sera trois fois triple de $e g$, c'est-à-dire, nonecuple: & si $a b$ est quadruple de $e h$, $a c$ sera quatre fois quadruple, c'est-à-dire, sexdecuple de $e g$.

30. Si l'on prend une troisième ligne $n o$ proportionnelle, en


sorte que $a b . e h :: e h . n o$. — les deux rectangles $a c$, &

$e g$, seront comme les lignes $a b$, & $n o$. Car $a b$ à $n o$, est en raison doublée d' $a b$ à $e h$. Et si $a b$ est double, ou triple, ou quatruple d' $e h$; $a b$ sera deux fois double, ou trois fois triple, ou quatre fois quatruple, de $n o$.

31. Ces rectangles qui ont ainsi leurs

D

costez proportionnels $a b . e h :: a d . e f$, s'appellent *semblables* : donc les costez homologues sont ceux qui se répondent



dans la proportion, comme $a b$ & $e h$, ou bien $a d$ & $e f$: car si $a b$ est le plus grand costé du

rectangle $a c$; $e h$ sera aussi le plus grand costé du rectangle $e g$.

32. Tous les quarez sont des rectangles semblables : car il est bien manifeste, que si $a b$ est double ou triple, &c. de $e h$; $a m$ sera aussi double ou triple de $h i$, puisque $a m$ est égal à $a b$, & $h i$ à $e h$.

33. Tous les rectangles semblables sont entre eux, comme les quarez bastis sur leurs costez homologues. Je dis que le rectangle $a c$ est au rectangle $e g$, comme le quarré $b m$ au quarré $e i$: car tant ces quarez que ces rectangles, sont entre eux en raison doublée de $a b$ à $e h$. (6. 29. 32.)

34. Pour connoître la raison de deux solides parallelepipedes rectangles, il faut connoître la raison de la base de l'un à la base de l'autre, & de plus la raison de la hauteur de l'un à la hauteur de l'autre : parce que la raison de

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 75
tout un solide à l'autre est composée des raisons des longueurs, largeurs & hauteurs ; ce qui est aisé à comprendre, si l'on a compris ce qui a esté dit des raisons des rectangles. Car si un parallelepède a sa base double de la base d'un second parallelepède, & la hauteur triple de la hauteur, le premier parallelepède sera deux fois triple, ou trois fois double, ou en un mot sextuple du second.


35. Si les bases de deux parallelepèdes rectangles sont réciproquement comme leurs hauteurs, les parallelepèdes sont égaux ; cela se prouve comme la vingt-septième de ce livre ; car d'autant que l'un surpasse l'autre en largeur & en longueur, d'autant est-il surpassé en hauteur.

36. Lorsque les parallelepèdes rectangles ont tous leurs costez proportionnels, on les appelle *semblables*, & ils sont en *raison triplée* de leurs costez, comme on dit des parallelogrammes, qu'ils sont en *raison doublée*.

37. Les parallelepèdes rectangles semblables sont entre eux comme les cubes bastis sur les costez homologues : car tant les cubes que les parallelepèdes, sont entre eux en raison triplée de leurs costez homologues.

B ij


38. Les rectangles qui ont même hauteur sont entre eux en raison de leurs bases. Soient les rectangles A & B entre les parallèles df & ac , en sorte que



ad soit égal à cf : je dis que $A. B :: ab. bc$, c'est-à-dire, que le rectangle A est au rectangle B, comme la base ab est à la base bc .

Que si, par exemple, ab est double de bc , A sera aussi double de B; & si ab est triple ou quadruple de bc , A aussi sera triple ou quadruple de B: car A n'est que la ligne ab multipliée par ad , (6. 17.) & B n'est que la ligne bc , multipliée par la même ad ou be qui luy est égale. Donc (6. 15.) $A. B :: ab. bc$.

39. Tous parallelogrammes, qui sont entre mêmes parallèles, sont entre eux comme leurs bases. Je dis que le pa-



rallelogramme $adeb$ est au parallelogramme $afge$, comme ab à ac : car ayant fait des rectangles pointil-
lez sur les mêmes bases, ces rectangles sont égaux aux

parallelogrammes. (3. 14.) Or ces rectangles sont comme leurs bases: (par la précédente) Donc les parallelogrammes aussi sont comme leurs bases, c'est à sçavoir, $adeb. afge :: ab. ac$.

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 77

40. Les triangles qui sont entre mesmes paralleles sont comme les bases, car ils sont la moitié des parallelogrammes.

41. Quand les triangles ont leurs bases sur une mesme ligne droite, & que leur sommet aboutit à un mesme point, ils sont censez estre entre mesmes paralleles, comme $a d e$, & $c d e$, ou bien $a d e$, & $b d e$.

42. Si dans un triangle on tire une ligne parallele à la base, cette ligne coupera les jambes proportionnellement. Soit le triangle $a b c$, & la ligne $d e$ parallele à $b c$, je dis que

$a d . a e :: a b . a c .$ & $::$

$d b . e c$. Car si l'on imagine les

lignes $c d$ & $e b$, le triangle

$c e d$ sera au triangle $e a d$,

comme $c e$ à $e a$: (6. 40. 41.)

de mesme le triangle $b d e$ au triangle

$d a e$, est comme $b d$ à $d a$. Or le trian-

gle $c e d$ est égal au triangle $b d e$: (3. 16.)

donc aussi le triangle $b d e$ ou $c e d$ est au

triangle $e a d$: : comme $b d$ à $d a$, ou

comme $c e$ à $e a$: donc encore $b d . d a ::$

$c e . e a$, puisque tant la raison de $b d$ à

$d a$, que celle de $c e$ à $e a$, expriment

une mesme raison du triangle $b e d$ ou

$c e d$ au triangle $e a d$.

43. Si dans un triangle $a c b$, on tire

une ligne $d e$, parallele à la base $c b$, je


D iij.





dis que $ed, cb :: ad, ab$,
ou $:: ae, ac$. car tirant ef
parallèle à ab , on aura fb
égale à ed . (3. 9.) Or par
la précédente $fb, cb :: ea,$
 $ca ::$ donc $ed, cb :: ea,$
 $ca ::$ ou da, ba .

44. On appelle *Triangles semblables* ceux qui ont tous les trois angles égaux, c'est-à-dire, ceux de l'un à ceux de l'autre, encore que les triangles soient iné-



gaux. Par exemple, si l'angle A est égal à l'angle a , & l'angle B à l'angle b , & l'angle C à l'angle c , tout le triangle A B C sera semblable au triangle abc .

45. Quand on a trouvé que deux triangles ont deux angles égaux chacun à chacun, on aura aussi trouvé que le troisième angle sera égal, & que les triangles seront semblables : car puisque les trois angles dans chaque triangle font la valeur de deux droits, (2. 9.) si les deux angles d'un triangle sont égaux aux deux d'un autre triangle, il faut que le troisième angle de l'un, soit égal au troisième de l'autre.


46. Tous les triangles semblables ont leurs costez (autour des angles égaux),

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 79
 proportionnels. Je dis que $A B. a b :: A C. a c :: B C. b c$. Car si dans le plus grand triangle $A B C$ on prend $A b$ égal à $a b$, & $A c$ égal à $a c$, le triangle $A b c$ sera tout égal au triangle $a b c$; (2. 11.) ainsi l'angle $A b c$ est égal à l'angle $a b c$: (2. 11.) donc aussi il est égal à l'angle B , lequel par l'hypothese l'est à l'angle b : donc la ligne $b c$ est parallele à la ligne $B C$: (1. 31.) donc (6. 42. 43.) $A b. A B :: A c. A C :: b c. B C$.

47. Tous les triangles semblables sont entre eux en raison doublée de leurs costez homologues, ou comme les quarez bastis sur leurs costez homologues. Soit $a b c$ semblable à $A B C$, en sorte que $a b. A B :: b c. B C$. Premièrement, si b & B sont angles droits, soient achevez les rectangles $b c d a$, & $B C D A$, ces rectangles $b d$ & $B D$ seront entre eux en raison doublée du costé $b c$, au costé homologue $B C$, ou comme le quarré basti sur $b c$, au quarré basti sur $B C$. (6. 29. 33.) Or le triangle $a b c$ est la moitié du rectangle $b c d a$, (3. 8.) & le triangle $A B C$ est la moitié du rectangle $B C D$: (3. 8.) donc aussi



D iiij




ces deux triangles sont entre eux en raison doublée des costez homologues, &c. Secondement, si les triangles ne sont point rectangles, comme dans les secondes figures, soient tirées les paralleles ad & AD , & puis soient faits les rectangles $b c d e$ & $B C D E$,

1. les triangles $a d c$, & $A D C$ seront semblables, à cause que l'angle d est égal à l'angle D , étant tous deux droits. Et de plus, l'angle $d a c$ est égal à l'angle $D A C$, à cause qu'ils sont égaux aux angles $a c b$, & $A C B$: (1. 31.) Donc $a c . A C :: c d . C D$. (6. 46.) Or $a c . A C :: b c . B C$: (par l'hypothese) donc $c d . C D :: b c . B C$: & par consequent aussi les rectangles $b d$ & $B D$ sont semblables, (6. 31.) & sont entre eux comme les quarez de leurs costez homologues: (6. 33.) donc aussi leurs moitez, c'est-à-dire, (3. 18.) les triangles $a b c$ & $A B C$ sont en raison doublée de leurs costez homologues, ou comme les quarez, &c.


48. Les *Polygones semblables* sont ceux qui ont autant de costez les uns que les autres, en telle sorte que chaque

angle d'un polygone soit égal à chaque angle de l'autre, & que tous leurs costez autour des angles égaux soient proportionnels, comme si l'angle A est égal à




l'angle *a*, & l'angle B à l'angle *b*, &c. & de plus que $A B. a b :: B C. b c :: C D. c d$, &c. Ces deux polygones sont semblables.

49. Et parmi les curvilignes, ou les mixtes, *figures semblables* sont celles dans lesquelles on peut inscrire, & autour desquelles on peut circonscrire des polygones semblables: en sorte que quelque polygone qu'on ait inscrit ou circonscrit en l'une, on en puisse inscrire ou circonscrire un semblable en l'autre. Par exemple, si ayant inscrit quelque polygone qu'il m'a plû, comme A B C D E, dans la grande curviligne, j'en puis inscrire un autre tout semblable dans la petite curviligne, *a b c d e*, ces deux curvilignes seront semblables. De mesme, si ayant pris deux mixtes, comme deux segmens de cercle A B C, & *a b c*, & ayant



D v



inscrit en l'un un triangle tel qu'il m'a plu, $A B C$, j'en puis inscrire en l'autre un autre tout semblable


abc , ces deux segmens seront semblables ; & ayant achevé les cercles, ces segmens seront égales portions de ces cercles, en sorte que si l'arc BAC est la troisième partie de son cercle, l'arc aussi bac sera la troisième partie de son cercle : & si vers le centre on tire des lignes BD , CD , bd , cd , les angles D & d seront égaux. (Voyez 4. 11. & suivans.)

50. Tous les cercles sont figures semblables.

51. Tous polygones semblables se peuvent diviser en un égal nombre de triangles semblables. Soient les polygones semblables $ABCDE$, & $abcde$; le premier soit divisé en ses triangles par les lignes BE , CE : (3. 24.) je dis que l'autre estant aussi divisé en triangles par les lignes be , & ce , tous les triangles de l'un seront semblables aux triangles de l'autre. Par exemple, abe à ABE , car l'angle a est égal à l'angle A , (par l'hypothese) & de plus $AB.ab :: AE.ae$: (aussi par l'hypothese) donc le triangle ABE est semblable à abe .

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 83

(5. 46.) On prouve ensuite que l'angle EBC est égal à l'angle ebc , à cause que l'angle ABC a été supposé égal à abc , & que par ce qui vient d'estre prouvé, l'angle abe est égal à l'angle D




ABE : donc, de choses égales ostant choses égales, l'angle EBC est égal à l'angle ebc . De même on prouve que l'angle ecb est égal à l'angle ECB , & par conséquent (6. 45.) tout le triangle ebc sera semblable au triangle EBC , ainsi de tous les autres.

52. Tous polygones semblables sont entre eux en raison doublée de leurs costez homologues, ou comme les quarrés bastis sur leurs costez homologues. Je dis que comme le quarré d' AB est au quarré d' ab , ainsi tout le polygone $ABCDE$ est au polygone $abcde$: car tous les triangles d'un polygone estant semblables à ceux de l'autre, (6. 51.) tous ceux de l'un sont à tous ceux de l'autre en raison doublée de quelques-uns de leurs costez homologues quels qu'ils soient, c'est-à-dire, comme le quarré d' AB , au quarré d' ab .

53. Toutes figures semblables, même les curvilignes, sont entre elles comme

D vj

les quarez bastis sur quelque costé de quelques figures semblables que ce soit qu'on y auroit inscrites ou circonscrites. Soit par exemple les cercles dans



lesquels on ait inscrit deux triangles semblables bac & BAC , je dis que tout le cercle ABC est au cer-


cle abc , comme le quarré de BC au quarré de bc , ou ce qui est le mesme, comme le quarré du demi-diametre DB , au quarré du demi-diametre db : car dans le cercle abc on peut (du moins par la pensée) inscrire ou circonscrire tel polygone qu'on voudra. (4. 30.) Or tout polygone inscrit dans abc aura plus petite raison au cercle ABC , que le quarré sur bc au quarré sur BC , & tout circonscrit dans abc aura plus grande raison au cercle ABC , comme on prouvera aisément par la précédente, & par ce qui a esté dit du cercle au livre quatrième : donc, &c.

54. Tout cecy s'applique aux solides. Solides semblables sont ceux qui ont les angles égaux, & les costez proportionnels, ou dans lesquels on inscrit ou circonscrit, &c.

55. Les solides semblables sont entre

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 85
 eux comme les cubes, &c. Voyez 6. 36.
 37. &c.

56. Si dans un triangle rectangle abc , on tire du sommet de l'angle droit a une perpendiculaire ad sur l'hypoténuse (ou grand costé) bc , on aura trois triangles rectangles tous semblables, sçavoir, adc , adb , & le total abc : car 1. tous ces trois triangles ont chacun un angle droit ; 2. les triangles abc & adb ont l'angle b commun : donc ils sont semblables ; (6. 45.) 3. les triangles abc & adc ont l'angle c commun : donc ils sont semblables.



57. La perpendiculaire ad est moyenne proportionnelle entre cd & db , c'est-à-dire, que $cd.da :: da.db$. Car les triangles cda & adb étant semblables par la précédente, cd , (qui est la petite jambe du triangle cda) sera à da (qui en est la grande jambe) comme ad (qui est la petite jambe du triangle adb) à db qui en est la grande jambe (6. 46.)

58. Le carré de ad est égal au rectangle fait de cd & de db : car puisque $cd.da :: da.db$, (par la précédente) le rectangle des extrêmes cd & db

sera égale au rectangle des moyennes $d a$ & $d a$ (6. 28.) Or les deux costez de ce rectangle estant égaux, puisque ce n'est



que $d a$ pris deux fois, il faut que ce rectangle soit le quarré de $d a$; & ainsi on peut mettre pour proposition générale, que

59. Le quarré de la moyenne proportionnelle est toujours égal au rectangle fait des deux extrêmes.

60. Pour exprimer un rectangle, il suffit de nommer trois lettres. Par exemple, quand on met le rectangle $b d c$, cela veut dire le rectangle, dont un costé est $b d$, & l'autre $d c$; & si l'on disoit le rectangle $b c d$, cela voudroit dire le rectangle, dont un costé seroit $b c$, & l'autre $c d$.



61. Dans tout triangle rectangle le quarré fait sur l'hypotenuse (ou sur le grand costé) est égal aux deux quarrés faits sur les jambes. (ou sur les autres costez) Soit le quarré $b c m n$ divisé par la perpendiculaire $a d e$ en deux rectangles $d e m$, & $d e n$: je dis que le rectangle $d e m$ est égal au quarré d' $a c$, & le rectangle $d e n$ au quarré d' $a b$; & que par consequent tout le quarré $b c m n$ est égal aux quarrés

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 87.
 de ac & de ab : car 1. les deux triangles adc & bac estant semblables, (6. 56.) dc à ac (dans le petit triangle adc) sera comme ac à bc : (dans le grand triangle bac) donc ac est moyenne proportionnelle entre dc & bc , ou cm ; ainsi le quarré ac est égal au rectangle $dc m$ (6. 59.) 2. Par mesme raison, on prouve que ba est moyenne proportionnelle entre bd & bc , ou bn , &c.

62. Si sur les trois costez du triangle rectangle on bastit trois figures semblables posées semblablement, la plus grande sera égale aux deux autres; car ces figures semblables estant comme les quarrés faits sur leurs costez homologues, (6. 53.) la figure A sera aux figures B & C , comme le quarré de bc est aux quarrés de ca & de ab . Or le quarré de bc est égal aux deux autres (par la précédente) donc, &c.





63. Si sur le grand costé bc on fait un demi-cercle bac , & sur les autres costez deux autres demi-cercles ban & ncd



& $a m c$, ce grand demi-cercle sera égal aux deux autres. (par la précédente) Que si de part & d'autre on ôte ce qui est commun, qui sont les segmens hachez $b a$, & $a c$, ce qui restera de part & d'autre sera égal ; c'est-à-dire, le triangle $b a c$ d'une part sera égal aux deux lunes $b n a$ & $a m c$ de l'autre : & c'est-là la quadrature des *Lunes d'Hippocrate de Scio*.


64. Lorsque le triangle $b a c$ est isoscele, les lunes sont égales ; de sorte que le triangle $b a o$, qui est la moitié de $b a c$, sera égal à chaque lune : mais lorsque le triangle est scalene, comme dans la seconde figure, les lunes sont inégales, & il est aussi difficile de partager le triangle $b a c$ en deux par la ligne $a o$, en sorte qu'on démontre que le triangle $b a o$ est égal à la lune $b n a$, & le triangle $o a c$ à la lune $c m a$: il est, dis-je, aussi difficile de faire cela, que de trouver la quadrature du cercle.

65. Deux cordes qui se croisent dans un cercle, ont leurs segmens réciproques, c'est-à-dire, réciproquement proportionnels. Je dis que $a e . b e :: e d . e c$: & que par conséquent le rectangle $a e e$




DE GEOMETRIE, LIV. VI. 89

est égal au rectangle bed : car si l'on imagine les lignes dc & ba , on aura deux triangles semblables, aeb & dec . Car




1. ils ont un angle vers e opposé par la pointe, & par conséquent égal ; (1. 23.) 2. l'angle d est égal à l'angle a (4. 12.) comme insistant sur le même arc bc , & aboutissant à la même circonférence : donc ces deux triangles sont semblables ; ainsi $ae. be :: ed. ec$. (6. 46.)

66. Si ac est diamètre du cercle, & db perpendiculaire, de ou be sera moyenne proportionnelle entre ae & ec , à cause que de sera égale à eb : (4. 6.) ainsi $ae. de :: be$ ou $de. ec$, & le quarré de fera égal au rectangle aec .




67. Deux lignes tirées d'un point extérieur vers un cercle, à la circonférence duquel elles sont terminées, sont entre elles réciproquement comme leurs segmens extérieurs : je dis que $ac. ad :: ae. ab$; & que par conséquent le rectangle cab est égal au rectangle dac : car si l'on imagine les lignes bd & ec , on aura deux triangles semblables





abd & aec : car 1. ils ont un angle commun a ; 2. l'angle d est égal à l'angle c , (4. 12.) comme insistant sur un même arc be : donc les triangles abd & aec sont semblables; (6. 45.) ainsi $ad. ac ::$ (qui sont les grands costez des deux triangles) $:: ab. ae$, (qui sont les petits costez des mêmes triangles.)

68. Si l'une de ces lignes ab touche le cercle en b , tandis que l'autre le coupe en e & en d , alors ab est moyenne



proportionnelle entre ae & ad : car ayant tiré les lignes be & bd , les triangles abd & aeb seront semblables, à cause que 1. ils ont un angle commun en a ; 2. l'angle abe est égal à l'angle bde : (4. 17.) donc ces deux triangles étant semblables, $ae. ab ::$ (qui sont les deux costez du petit triangle aeb) $:: ab. ad$ (qui sont les costez homologues de l'autre triangle adb .)



69. Soit le diamètre ab coupé en c par la perpendiculaire infinie ee , ou au dedans du cercle, comme en la première figure, ou à la circonférence, comme en la deuxième figure, ou hors le

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 91


cercle, comme en la troisiéme figure : soit de plus du point *a* tirée telle ligne droite que l'on voudra, coupant la perpendiculaire en *e*, & le cercle en *d*; je dis que toujours $ad. ac :: ab. ae$. Car si l'on tire la ligne *bd*, on aura deux triangles semblables *ea**c* & *da**b*, à cause que 1. ils ont un angle commun *ea**c* & *da**b*; 2. ils en ont un autre droit, car l'angle *ace* est droit, (par l'hypothese) & l'angle *bda* est aussi droit : (4. 14.) donc ces deux triangles estant semblables, $ad. ac :: ab. ae$.

70. Dans la deuxième figure, *ab* est toujours moyenne proportionnelle entre *ad* & *ae*; & dans la première, la moyenne est *aE*, où le cercle coupe la ligne *ce*.

71. Si dans le triangle inscrit, l'angle *bac* est partagé en deux également par la ligne *aed*, je dis que $ba. ae :: ad. ac$; car ayant tiré la ligne *bd*, on aura deux triangles semblables *abd* & *aec*, à cause que 1. l'angle *d* est égal à l'angle *c*, (4. 12.) comme insistant sur le




mesme arc ab , & aboutissant à la mesme circonference; 2. l'angle bad est égal à l'angle $ca c$, par l'hypothese: donc



ces deux triangles sont semblables: & partant $ab. ad :: ae. ac$.

72. Lors que l'angle du sommet est ainsi partagé en deux également, les segmens de la base sont proportionnels avec les costez, $ba. ac :: be. ec$: car imaginant ef parallele à ba , nous aurons $ba. ac :: ef. fc$. Or ef est égal à af , à cause que l'angle $ae f$ est égal à l'angle eab , (1. 31.) & par consequent à l'angle caf : ainsi le triangle afe est isoscele; (2. 15.) ainsi au lieu de mettre $ba. ac :: ef. fc$: nous pouvons mettre $ba. ac :: af. fc$: ou bien (6. 42.) $be. ec$: ce qu'il falloit prouver.

73. Si deux cercles se touchent l'un dans l'autre, & que du point d'atouchement a on tire une tangente, & la perpendiculaire acb , laquelle



passera par les centres des deux cercles, (4. 5.) & que de plus on tire telle autre ligne que l'on voudra, coupant les deux cercles en e & d , je dis que tou-

DE GEOMETRIE, LIV. VI. 93
 jours $a e. a d :: a c. a b$: car ayant tiré
 les lignes $e c$ & $d b$, les triangles $a e c$
 & $a d b$ seront semblables ayant un an-
 gle commun en a , & un autre droit en e
 & en d . (4. 14.)

74. L'arc $e c$ sera aussi à l'arc $d b$, com-
 me tout le cercle $a e c$ au cercle $a d b$.
 (6. 49. & 4. 11. & c.)





LIVRE SEPTIÈME.

Des Incommensurables.

1. **U**N E petite quantité est dite *en mesurer* une autre plus grande, lorsque la petite étant prise un certain nombre de fois, égale précisément la plus grande. Par exemple, supposé qu'une toise contienne six pieds, un pied *mesurera* la toise, parce qu'un pied pris six fois, égale précisément la toise.

2. La quantité qui en mesure une plus grande, s'appelle *Partie* de la grande, & la grande s'appelle *Multiple* de la petite : ainsi un pied est partie de la toise, & la toise est multiple du pied.

3. Si l'on prend une grandeur d'un pas qui contienne deux pieds & demi, & qu'on veuille essayer d'en mesurer la toise, on ne pourra pas le faire, parce que si l'on prend ce pas seulement deux fois, on ne fera que cinq pieds, qui ne valent pas la toise : & si l'on prend ce même pas trois fois, on aura sept pieds & demi, qui surpasseront la toise ; ainsi

cette quantité de deux pieds & demi ne mesure pas la toise, & n'est pas à proprement parler *partie* de la toise : néanmoins on peut dire que c'en sont *des parties*, parce que cette quantité contient cinq demi-pieds : or un demi-pied est partie de la toise, parce qu'estant pris douze fois il la mesure ; ainsi ce pas contient des parties de la toise, puisqu'il contient cinq demi-pieds, qui sont $\frac{5}{12}$, c'est à dire, cinq douzièmes parties d'une toise.

4. Lors que deux quantitez sont telles, qu'on peut trouver une troisième quantité qui soit partie de l'une & de l'autre, c'est à dire, qui mesure l'une & l'autre, alors ces deux quantitez sont *commensurables* ; ainsi cette quantité d'un pas d'une part, & une toise de l'autre, sont deux quantitez commensurables, parce que l'on peut donner une troisième quantité, sçavoir un demi-pied, laquelle mesurera la toise & ce pas : car le demi-pied pris cinq fois égale ce pas, & ce même demi-pied pris douze fois égale la toise.

5. Mais s'il n'est pas possible de trouver une troisième quantité qui mesure l'une & l'autre, alors ces deux quantitez sont *incommensurables*.

6. Les grandeurs commensurables sont *comme nombre à nombre*, c'est à dire, qu'on peut exprimer ces grandeurs par de certains nombres, en sorte que comme une grandeur est à l'autre grandeur, ainsi un certain nombre soit à un autre certain nombre. Par exemple, si une ligne est d'une toise ou de six pieds, & une autre ligne d'un pas de deux pieds & demi, ces deux lignes seront comme nombre à nombre : car puis que le demi-pied mesure l'une & l'autre, l'une par cinq, & l'autre par douze, il est clair que l'une contenant cinq demi-pieds, & l'autre en contenant douze, ces deux lignes seront comme cinq à douze, & par conséquent comme nombre à nombre.

7. Si deux grandeurs ne sont point comme nombre à nombre, c'est-à-dire, s'il n'est pas possible d'exprimer leurs grandeurs par deux nombres, elles seront incommensurables : cela paroît par la précédente.

8. Il faut donc voir maintenant s'il y a en effet des grandeurs qui soient telles qu'on ne puisse point les exprimer par des nombres : car si cela est, il faudra dire qu'il y a des grandeurs incommensurables.

9. *Un nombre plan* est celui qui peut provenir de la multiplication de deux nombres,

DE GEOMETRIE, LIV. VII. 97

nombres. Par exemple, six est nombre plan, parce qu'il provient de la multiplication de trois & de deux: car deux fois trois font six. De mesme, quinze est un nombre plan, parce qu'il provient de cinq multiplié par trois. De mesme, neuf est un nombre plan, parce qu'il provient de trois par trois.

10. Les nombres, qui estant ainsi multipliez l'un par l'autre, produisent un plan, s'appellent *costez* de ce plan, comme 2. & 3. sont les costez de 6. de mesme 3. & 5. sont les costez de 15.


11. Si l'on imagine les unitez comme de petits quarrez, ces quarrez se pourront ranger en rectangle, quand leur nombre sera plan. Par exemple, 12. quarrez se rangent en un rectangle, dont un costé sera six, & un autre costé sera deux; & de mesme 48. sera un rectangle, dont un costé est 12. & l'autre 4. Voyez les figures suivantes B & C.

12. *Nombre quarré* est un plan, dont les costez sont égaux, comme 4. provenant de deux multiplié par deux, comme 9. provenant de trois par trois, comme 16. provenant de 4. par 4. &c.


13. Un nombre quarré se peut ranger en quarré; & le nombre qui se peut ranger en quarré, est quarré, & celui qui ne scauroit se ranger en quarré, n'est pas nombre quarré.

E

14. Nombres *Plans semblables* sont



ceux qui peuvent se ranger en rectangles semblables, c'est-à-dire, en des rectangles dont les costez



sont proportionnels, comme 12. & 48. car les costez de 12. sont 6. & 2. comme l'on voit dans la figure B. & les costez de 48. sont 12. & 4. comme l'on voit dans la figure C. or $6. 2 :: 12. 4$.

15. Tous les nombres quarréz sont plans semblables. (6. 32.)

16. Tout nombre peut se ranger en ligne droite, & en cet estat il peut passer pour plan: de sorte que 3. dans la figure A, sera un plan semblable à 12. car les costez du plan de trois sont 3. & 1. parce qu'une fois trois c'est trois, & les costez de 12. sont 6. & 2. or $3. 1 :: 6. 2$.

17. Il y a des nombres qui ne sont pas plans semblables, comme depuis 1. jusqu'à 10. il y a 1. 4. 9. qui sont semblables étant quarréz; puis il y a 2. 8.


DE GEOMETRIE, LIV. VII. 77

qui ont un costé double de l'autre : les autres ne le sont pas, comme 2. 3. 4. 5. 6. 7.

18. Si un nombre quarré multiplie un autre nombre quarré, il produira un troisiéme quarré A. 4. &

B. 9. estant nombres quarez, se multiplient, & produisent un nombre C; sçavoir 36. Je dis que ce troisiéme nombre

est un nombre quarré : car multiplier B par A, c'est prendre B autant de fois qu'il y a d'unitéz dans A. Or je puis considérer tout le nombre B. 9. comme un quarré unique, & puis le prendre autant de fois qu'il y a d'unitéz ou de petits quarez en A : & comme ces unitéz d'A sont rangées en quarré ; aussi je pourray ranger en quarré tout autant de quarez B comme autant d'unitéz ; de sorte qu'icy il y aura 4. B qui feront le quarré total C. 36.



19. Si deux nombres plans sont semblables, le grand se peut partager en autant de quarez qu'il y aura d'unitéz dans le petit. A 3. & B. 12. sont plans semblables : en sorte que le costé 3. est au costé 6. comme le costé 1. est au costé 2. Je puis partager ce plan B 12. en trois quarez rangez de mesme que les trois petits quarez du plan A, & chacun de

E ij

ces grands quarrez de B en vaudra 4. de ceux d'A. De mesme, si les plans sont 8. & 72. je puis diviser 72. en 8. quarrez, dont chacun en comprendra 9. de ceux du petit plan 8. La mesme chose arrivera encore, bien qu'un de ces nombres, ou mesme tous deux soient rompus, comme si A. contient 3. & demi, & B. 14. je puis partager 14. en trois quarrez & demi, disposez comme ceux d'A, comme l'on voit



par les petits quarrez ponctués, qui ont esté ajoustez à ces figures. De

mesme, si les plans sont B 12. & D

27. je puis partager 27. non seule-


ment en trois quarrez rangez comme ceux d'A, mais aussi en 12. rangez comme ceux de B; ce que l'on voit icy par les lignes ponctuées. Pour cela il ne faut que partager les costez du grand plan en autant de parties que sont partagez les costez homologues du petit plan. Les figures feront aisément comprendre tout cecy.

20. Les nombres plans qui se peuvent

ainsi partager, en sorte qu'il y ait autant de quarrez dans le grand plan, que d'unitéz dans le petit, sont semblables, c'est la converse de la précédente.

21. Deux nombres plans semblables multipliez l'un par l'autre produisent un nombre quarré. Car ayant partagé le grand plan en autant de quarrez qu'il y a d'unitéz dans l'autre plan, (7. 19.) on multipliera un plan par l'autre, en prenant les grands quarrez du grand plan autant de fois qu'il y a d'unitéz ou de petits quarrez dans le petit plan, c'est-à-dire, autant de fois qu'ils sont eux-mêmes. Or multiplier un nombre de quarrez par ce même

nombre, c'est faire un quarré de ces quarrez. Par exemple A 3. & B 27. étant plans semblables, je considere




B. 27. comme un plan composé de trois grands quarrez, comme A 3. est un plan composé de trois unitéz, ou de 3. petits quarrez. Ainsi si je prens ces trois grands quarrez autant de fois qu'il y a d'unitéz en A, c'est-à-dire, trois fois, je feray trois fois trois de ces grands quarrez de B, c'est-à-dire, 9. quarrez, dont chacun en vaudra 9. de ceux qui sont dans A, & tous

E iij

ces 9. quarrez de B. en vaudront 81. de ceux d'A; de sorte qu'A 3. multipliant B. 27. produit 81. qui est un nombre de petits quarrez rangez en carré, & par conséquent (7. 13.) ce nombre 81. est carré: De mesme, si les plans sont 12. & D. 27. je partage 27. en 12. quarrez, que je multiplie par 12. & il provient 144. grands quarrez rangez en carré, qui en vaudront 324. de ceux du petit plan.

22. Si deux nombres plans sont semblables, de quelque façon que l'on range l'un, on pourra ranger l'autre de mesme. Soient 3. & 12. plans semblables comme dessus. Qu'on range 12. en ligne droite pour faire un rectangle, dont un costé soit 12. & l'autre 1. je dis qu'on pourra ranger 3. en un rectangle semblable, qui aura pour un costé 6. & pour l'autre, la moitié d'un, &c.

23. Si un nombre divise un autre nombre carré, il produira un troisième nombre, qui sera plan semblable au diviseur.



Soit le carré ac 16. & qu'on le divise par quelque nombre que ce soit, par exemple, par 8. ce qui se fait en prenant la huitième partie du costé ad , sçavoir ae , & tirant la parallèle ef ; car on aura le plan af .

DE GEOMETRIE, LIV. VII. 103

qui fera la huitième partie du quarré ac . Or diviser un nombre ou un plan par 8. c'est prendre la huitième partie de ce nombre ou de ce plan. Je dis que af est un plan semblable à 8. Car 8. étant rangé en ligne droite pour faire un rectangle, dont un costé soit 8. & l'autre 1. le rectangle af luy sera semblable, puisque ac a esté pris la huitième partie de ad ou de ab : Donc comme 8. à 1. (qui sont les costez du plan 8. diviseur) ainsi ab à af : (qui sont les costez du plan provenant du quarré ac divisé par 8.) donc, &c. ce qu'il falloit prouver.

24. Si deux plans se multipliant produisent un quarré, ils sont semblables.

25. Deux nombres plans non-semblables se multipliant, ne sçauroient produire un nombre quarré. Ces propositions sont des suites des précédentes.


26. Si deux nombres sont plans semblables, leurs équimultiples quelconques, & leurs parties-pareilles quelconques, sont aussi plans semblables. Soient les plans $abcd$ 3. &

A B C D

12. semblables, en sorte qu'

ab . A B ::

bc . B C.




E iij

Je dis que si l'on prend le double de l'un & le double de l'autre, (ou tel autre équivmultiple qu'on voudra) ces doubles seront semblables : car ayant pris $a e$ double d' $a d$, & $A E$ double d' $A D$, pour avoir le plan $b e$ double du plan $b d$, & le plan $B E$ double du plan $B D$, il est clair que $a d. A D :: a e. A E$. Or $a d. A D :: a b. A B$. donc aussi $a e. A E :: a b. A B$; & par conséquent les plans $b e$ & $B E$ sont semblables. De même en sera-t-il, si l'on prend leurs moitiés $b o$, $B O$, ou telles autres parties pareilles que l'on voudra.

27. Si deux nombres sont plans non-semblables, leurs équivmultiples quelconques, & leurs parties pareilles quelconques seront aussi non-semblables. Ceci suit de la précédente.

28. Entre deux nombres plans semblables quelconques, il tombe un nombre moyen proportionnel. Soient les nombres plans semblables 2. & 8. je dis qu'il est




possible de trouver un troisième nombre qui sera moyen proportionnel: car si l'on imagine le plan

8. rangé en ligne droite $A B$, & le plan 2. rangé aussi en ligne droite $A D$, & que de ces deux lignes on en fasse le plan

DE GEOMETRIE, LIV. VII. 105

A C 16. ce plan A C 16. proviendra de la multiplication des deux nombres 2 & 8. (6. 17. & suivans) & par consequent le nombre des petits quarrés de tout ce plan A C 16. sera un nombre quarré, (7. 21.) & se pourra ranger en quarré, (7. 13.)

Qu'il soit donc rangé dans le quarré ac ; ainsi le quarré ac sera égal au plan A C, puisque ce n'est qu'un mesme nombre rangé autrement. Donc (6. 59.) le costé ab 4. sera moyen proportionnel entre AD 2. & A B 8.




29. Entre deux nombres non-semblables, il ne sçauroit tomber un nombre moyen proportionnel. Soient les nombres 4. & 6. rangez chacun en droite ligne, & que se multipliant ils produisent le plan 24. ce plan 24. n'est point un nombre quarré; (7. 25.) & par consequent il ne sçauroit se ranger en nombre quarré. Donc il ne sçauroit y avoir de nombre moyen entre 4. & 6. car ce nombre prétendu moyen multiplié par soy - mesme, produiroit un nombre quarré, & d'ailleurs égal au plan fait de 4. & de 6. (6. 59.) ce qui est impossible, puisque ce plan 24. fait de 4. & de 6. n'est point nombre quarré.

30. Soient deux lignes ae & ec , comme un nombre à un autre nombre non-


E y

semblable : par exemple , comme 1. à 2.
Soit de plus $e b$ moyenne proportion-



nelle, en sorte que $ae. eb :: eb. ec$: je dis que eb est incommensurable aux deux extrêmes ae & ec : car ae & ec estant comme 1. & 2. c'est-à-dire , comme nombres non-semblables , (par l'hypothese) aussi-bien que leurs équimultiples quelconques , (7. 27.) il ne sera jamais possible de trouver un nombre moyen porportionnel entre ae & ec , (par la précédente) & par consequent eb ne sera pas à ae ou à ec comme nombre à nombre : Donc elle est incommensurable.

31. Le diamètre d'un quarré ab est incommensurable au costé ac . Car prenant ad double d' ac , & faisant le triangle abd



qui sera semblable à abc , à cause que cd estant égal à cb , l'angle cdb est égal à l'angle cbd ; (2. 15.) ainsi l'angle cdb est la moitié d'un droit , aussi-bien

que cab : donc abd est droit, &c. Ainsi $ac.ab :: ab.ad$. Donc ab est moyenne proportionnelle entre ac 1. & ad 2. & par consequent (par la précédente) incommensurable.

32. On appelle *Puissance* d'une ligne le quarré que l'on fait sur cette ligne. La puissance de ac est le quarré $acbe$, & la puissance de la ligne ab est le quarré $abdf$. Et l'on dit que la ligne ab peut deux fois la ligne ac , (*bis potest lineam* ac) qui est une façon de parler prise du Grec & receüe en Géometrie.

33. Le diametre ab est commensurable en puissance au costé ac , c'est-à-dire que le quarré $abdf$ est commensurable au quarré $acbe$, l'un estant double de l'autre.

34. Mais si l'on prend ao moyenne proportionnelle entre ab & ac , cette moyenne ao sera incom- $a \text{ --- } o$ mensurable en puissance, c'est-à-dire, que le quarré d' ao sera incommensurable au quarré d' ac , ou au quarré d' ab : car le quarré d' ac au quarré d' ao est en raison doublée d' ac à ao , (6. 29.) c'est-à-dire, comme ac à ab , (6. 30.) Or ac est incommensurable à ab : (7. 31.) Donc aussi le quarré d' ac est incommensurable au quarré d' ao .

35. *Seconde puissance* d'une ligne est le cube, qui a pour costé cette ligne.

36. Si l'on prend an & am , deux moyennes proportionnelles entre ac & ab , en sorte que $a \text{ --- } n$
 $ao. an :: am. ab$. la ligne $a \text{ --- } m$
 am sera incommensurable en

seconde puissance à ac , c'est-à-dire, que le cube d' ac sera incommensurable au cube d' an , parce que le cube d' ac est au cube d' an en raison triplée du costé ac au costé an , c'est-à-dire, comme ac à ab . Or ac & ab sont incommensurables, &c. Mais aussi ac & am sont commensurables en seconde puissance, car le cube d' am est double du cube d' ac .

37. Il est aisé d'appliquer aux nombres solides ce qui a esté dit des nombres plans. On appelle *nombres solides* ceux qui proviennent de la multiplication d'un nombre plan par quelque nombre que ce soit : Par exemple, 18. est nombre solide fait de 6. (qui est un nombre plan) multiplié par 3. ou de 9. multiplié par 2.

38. Nombres *solides semblables* sont ceux dont les petits cubes peuvent se ranger, en sorte qu'ils fassent des parallelepipedes rectangles semblables.

39. Nombres *cubiques* sont ceux qui se peuvent ranger en cubes, comme 8, ou 27. dont les *costez* sont 2. & 3. les *bases* sont 4. & 9.

40. Tout nombre cubique multipliant un autre nombre cubique, produit un troisième nombre cubique.

41. Entre deux nombres solides semblables, il tombe deux nombres moyens proportionnels.

DE GEOMETRIE, LIV. VII. 109

On n'a qu'à appliquer aux solides ce qui a esté démontré à l'égard des plans.

42. Ces démonstrations par lesquelles on prouve qu'il y a des lignes & des grandeurs incommensurables, prouvent aussi que le *Continu* n'est pas composé de points finis : car si le diametre aussi-bien que le costé d'un quarré estoient composez de points finis, le point mesurerait le costé & le diametre : car le point se trouveroit un certain nombre de fois dans le costé, & un autre certain nombre de fois, dans le diametre ; ce qui est impossible (par les démonstrations précédentes.)

43. Comme dans un triangle rectangle le quarré du grand costé est égal aux deux quarez faits sur les deux autres costez, (6. 61.) on s'est toujours servi de ce triangle pour trouver des incommensurables : car si tous les trois costez sont commensurables, ils pourront estre tous trois exprimez par trois nombres, & alors le quarré du plus grand nombre sera égal aux quarez des deux autres nombres. Comme si le grand costé est de 5. pieds, le petit de 3. le mediocre de 4 ; le quarré de 5. sera 25. & les autres quarez seront 9. & 16. & ces deux ensemble 9. & 16. font le troisiéme 25. Mais si le petit costé est 2. & le mediocre 3. le grand costé ne pourra point s'exprimer par nombres, parce

que le quarré du petit costé 4. joint avec le quarré du mediocre 9. fait 13. qui exprime le quarré fait sur le grand costé : or comme ce nombre 13. n'est point nombre quarré, aussi ne sçauroit-il avoir de costé ou de racine exprimée par aucun nombre.

44. De tout temps on s'est appliqué à rechercher quelque methode pour trouver divers nombres propres à exprimer tous les trois costez du triangle rectangle, pour estre asseûrez que tous ces trois costez sont commensurables. Voicy une methode par laquelle on trouve tous les nombres possibles propres à cét effet.


45. Si l'on prend deux nombres quelconques, (mesme l'unité) qui ne different que de l'unité, & qu'on joigne ensemble les deux quarrez de ces deux nombres ; on aura un nombre qui sera racine d'un quarré égal à deux quarrez, & ce nombre exprimant le grand costé d'un triangle rectangle, le costé mediocre sera exprimé par un nombre moindre de l'unité ; & le petit costé par les deux premiers nombres joints ensemble. Par exemple, ayant pris 1. & 2. & quarré l'un & l'autre, pour avoir 1. & 4. je joins ensemble ces deux quarrez 1. & 4. & je fais 5. je dis que 5. pourra exprimer le grand costé, & 4. le mediocre, & 3. le petit, en sorte que 25. quarré du grand costé sera

DE GEOMETRIE, LIV. VII. III

égal à 16. & à 9. quarrez des deux autres costez. De mesme, si je prens 2. & 3. & que joignant leurs quarrez 4. & 9. je fasse 13. je dis que j'auray 13. & 12. & 5. pour costez d'un triangle rectangle, en sorte que 169. quarré de 13. sera égal à 144. & 25. quarrez de 12. & de 5. De mesme, prenant 3. & 4. & joignant leurs quarrez 9. & 16. je fais 25. je dis que 25. sera le grand costé du triangle, 24. le costé mediocre, & 7. le petit.

Tout cela se trouve plus facilement en cette sorte.

46. Si l'on range les unitez en sautoir,



tous les nombres qui feront une figure quarrée seront des noms propres à exprimer le grand costé. Le petit costé sera le nombre compris dans les deux premiers rangs de la figure quarrée, & le costé mediocre sera d'une unité moindre que le plus grand.

47. Cette figure continuée donnera tous les nombres possibles : mais il faut remarquer que les équimultiples des trois nombres trouvez auront le mesme effect ; comme ayant trouvé 5. 4. & 3. leurs doubles 10. 8. & 6. représenteront les trois costez du triangle, en sorte que 100. quarré de 10. est égal à 64. & 36. quarez de 8. & de 6. & de mesme leurs triples 15. 12. 9. feront la mesme chose : mais l'on voit bien que tous ces nombres ayant toujours les mesmes proportions, n'expriment jamais qu'un mesme triangle, sçavoir, celui qui est exprimé par 5. 4. & 3. & qu'ainsi tous ces nombres doivent estre censez les mesmes.





LIVRE HUITIEME.

Des Progressions & des Logarithmes.

1. **U**N E *Progression* est une suite de quantitez qui gardent entre elles quelque sorte de rapport semblable, & chacune de ces quantitez s'appelle *Terme*.

2. Lorsque les termes qui se suivent ainsi les uns après les autres, augmentent ou diminuent également ; la *Progression* s'appelle *arithmetique*, comme sont les nombres naturels 1. 2. 3. 4. 5. &c. ou bien les nombres impairs 1. 3. 5. 7. 9. 11. &c. ou bien encore comme 4. 8. 12. 16. ou comme 20. 15. 10. 5. 0.

3. La *Progression arithmetique* peut augmenter à l'infini, mais non pas diminuer.

4. Si dans une *Progression arithmetique* on prend quatre termes, dont les deux premiers soient éloignez l'un de l'autre autant que le sont les deux derniers ; ces quatre termes sont dits *proportionnels en proportion arithmetique*, com-

me dans la Progression des nombres naturels 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. &c. Si nous prenons 2. 3 :: 9. 10. (cette marque :: nous servira de signe pour la proportion arithmetique) il y aura mesme proportion arithmetique entre 2. & 3. qu'entre 9. & 10. c'est-à-dire, que 10. surpasse 9. de tout autant que 3. surpasse 2. De mesme 3. 5 :: 8. 10. sont en proportion arithmetique. Comme aussi 1. 5. :: 5. 9. ou 5. estant répété deux fois, est le moyen arithmetique entre 1. & 9.

5. Dans la proportion arithmetique l'aggrégé des deux extrêmes est égal à l'aggrégé des deux moyens, comme dans 2. 3 :: 9. 10. l'aggrégé de 2. & de 10. est 12. & l'aggrégé de 3. & de 9. est aussi 12. De mesme, dans 3. 5 :: 8. 10. l'aggrégé de 3. & de 10. est 13. & l'aggrégé de 5. & de 8. est aussi 13. Et la raison de cecy est assez claire d'elle-mesme : car si 10. surpasse 8. aussi ce qu'on ajousté à 8. sçavoir, 5. surpasse de tout autant ce qu'on ajousté à 10. sçavoir 3. ainsi on fait l'égalité.

6. L'aggrégé ou la somme du premier & du dernier terme est égal à la somme du 2. & du penultième, ou du troisième de l'antepenultième, &c. comme dans le premier exemple 1. & 9. font 10. & de mesme 2. & 8, ou bien 3. & 7. ou 4. &

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 115

6. font toujours 10. & il reste au milieu 5. qui estant pris deux fois (comme équivalent à deux, puis qu'il est également éloigné du premier & du dernier) fait aussi 10.

7. Si l'on ajoust le premier au dernier terme, & que l'on multiplie leur somme par la moitié du nombre des termes, le produit sera égal à l'aggrégé de tous les termes ensemble, comme icy ajoustant 1. à 9. pour avoir 10. & multipliant 10. par 4. & $\frac{1}{2}$ (car il y a 9. termes) on fera 45. qui est la somme de tous les termes depuis 1. jusqu'à 9. Cecy est manifeste par la précédente.

8. Lors que les termes de la progression sont continuellement proportionnels; c'est à dire, que le 1. est au 2. comme celuy-cy est au 3. & comme le 4. au 5. &c. alors la Progression s'appelle *Geometrique*, comme 1. 2. 4. 8. 16. 32. ou bien 1. 3. 9. 27. 81. ou bien 3. 12. 48. 192. 768. ou bien 8. 4. 2. 1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$, &c.

9. La Progression geometrique peut augmenter & diminuer à l'infini.

10. Lors que la Progression commence par 1. le second terme s'appelle *Racine* ou *Costé*: le 3^e s'appelle *Quarré* ou 2^e degré: le 4^e *Cube* ou 3^e degré: le 5^e

Quarré-Quarré ou 4^e degré, le 6^e Surfoli-
de ou 5^e degré, le 7^e Quarré-Cube, &c.

II. Si l'on prend quatre termes, dont les deux premiers soient autant éloignés l'un de l'autre dans la progression, que le sont les deux derniers, ils seront simplement proportionnels, & le produit des extrêmes sera égal au produit des moyens. (6.28.)

12. Soit la quantité A B divisée en C, en D, en E, en F, &c. en sorte que A B. A C :: A C. A D :: A D. A E, &c. je dis que B C. C D. D E. E F, &c. seront en progression géométrique continuellement proportionnels, & même

G	F	E	D	C	B
---	---	---	---	---	---

A _____
que A B. A C :: B C. C D :: C D. D E,
&c. car puisque A B. A C :: A C. A D,
il sera *dividendo* A B moins A C. (c'est-
à-dire, C B.) A C :: A C moins A D,
(c'est-à-dire, D C.) A D. & par consé-
quent *alternando* C B. D C :: A C. A D.
ou :: A B. A C. ainsi de toutes les autres,
on prouvera :: D C. E D :: F E :: G F,
&c.

13. Soit une Progression de quantitez en ligne droite $BC, CD, DE, EF, \&c.$ soit prise Cd égale au second terme CD , afin d'avoir dB , la difference du premier & plus grand terme au second, & que

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 117

l'on fasse comme Bd à BC :: ainsi BC à une 4. ligne, sçavoir, BA . je dis que si le nombre des termes BC , CD , DE , &c. est fini, pour grand que soit d'ailleurs ce nombre, tous ces termes pris ensemble, quand il y en auroit cent mille millions, seront plus petits que BA . Que si l'on

F E D C d B

A —————

supposoit que ces termes fussent infinis en multitude ; alors ces termes tous ensemble seroient précisément égaux à BA : car puisque par l'hypothese Bd (c'est-à-dire BC moins Cd ou CD) est à BC :: comme BC . (c'est-à-dire AB moins AC) est à AB ; on trouvera aisément que comme BC . CD :: AB . AC :: AC . AD . &c. & par conséquent tous les termes CD , DE , EF , &c. se trouveront toujours par-deçà le point A , duquel on s'approchera toujours d'autant plus près, qu'on augmentera le nombre des termes ; ainsi l'on voit bien que tous ces termes, (qui sont ce qu'on appelle dans l'Ecole *Parties proportionnelles*) quand ils seroient actuellement infinis, ne feront pas une longueur infinie, puisqu'ils sont tous renfermez dans BA .

14. Cette démonstration se rend sensible dans un exemple d'une progression particuliere, dont les termes sont en rai-

son double. Par exemple, B C. double de
 F E D C d B

A

CD. & CD. double de DE. *etc.* : car si le nombre des termes est fini, quand il y en auroit cent millions, qu'on prenne le dernier & plus petit terme, par exemple FE, ajoustons à ce dernier FE une autre quantité qui luy soit égale, sçavoir, FA; il est clair que EA sera égal au penultième terme ED : car ce penultième ED est double du dernier FE, par l'hypothèse : or EA est aussi double de FE, puis que nous posons FA égal à EF. De mesme AE avec DE, c'est-à-dire, AD, sera égal au suivant terme CD : & en suite AC sera égal à BC. De sorte que l'on voit par là que le premier & plus grand terme est toujours égal à tous les autres ensemble, pourveu qu'on y ajousté une quantité égale au dernier & plus petit terme : mais que si on n'y ajousté rien, le premier est toujours plus grand que tous les autres pris ensemble. Si l'on suppose que ces termes soient actuellement infinis, alors le plus grand terme BC sera précisément égal à tous les autres infinis pris ensemble, CD, DE, EF, *etc.* Car l'on voit bien que plus on ajousté de termes, plus aussi on avance vers A, en retranchant toujours la moitié de ce qui reste,

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 119

Or retranchant ainsi continuellement d'une quantité la moitié, & de ce qui reste encore la moitié, & puis encore la moitié de ce qui reste, il est manifeste que si l'on supposoit qu'on eust retranché actuellement une infinité de fois ainsi la moitié, il ne resteroit plus rien. Cela se peut aussi démontrer par la réduction à l'impossible, en montrant que tous ces termes infinis pris ensemble ne sont ni plus grands, ni plus petits que B A.

15. Par là on peut résoudre des difficultés que l'on fait dans les Ecoles contre la divisibilité du continu, & que ceux qui ne sçavent pas la Géométrie pensent estre insolubles, mais qui au fond ne sont que de purs paralogismes.

16. Si l'on met deux Progressions, l'une géométrique; commençant par 1. & l'autre arithmétique, commençant par 0, en sorte que les termes de l'une répondent vis-à-vis des termes de l'autre, les termes de l'arithmétique s'appelleront *Logarithmes*, & *Exposans*, comme

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256.

17. Ce qui se fait par multiplication & par division dans la Progression géométrique, se fait par addition & par soustraction dans les logarithmes: Comme si ayant les trois nombres 2. & 8 :: 64. on

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256.

veut chercher le quatrième nombre proportionnel dans la progression géométrique, il faut multiplier le 8. par 64. (qui sont les deux termes moyens) car le produit 512. sera égal (6. 28.) au produit de 2. & de cet autre quatrième nombre, qui doivent estre les extrêmes des 4. proportionnels : ainsi pour trouver ce quatrième nombre, il faut seulement diviser 512. par 2. & l'on aura 256. ainsi $2. 8. :: 64. 256.$ de sorte que 64. & 256. seront autant éloignez l'un de l'autre dans l'ordre de la progression que le sont 2. & 8. (8. 11.) mais si au lieu des nombres géométriques $2. 8. :: 64.$ on avoit pris les logarithmes qui leur répondent, sçavoir, $1. 3. :: 6.$ & qu'on eust voulu trouver le quatrième logarithme, il auroit falu ajouster 3. à 6. pour avoir 9. & oster 1. de 9. pour avoir 8. qui seroit le logarithme qui répond au nombre géométrique 256.

18. De mesme, si l'on prend deux nombres géométriques 4. & 8. sur lesquels répondent les logarithmes 2. & 3. en multipliant 4. par 8, on aura 32. qui sera sous le logarithme 5. lequel provient de l'addition de 2. & de 3.

19. De mesme prenant 16. & le multipliant par luy-mesme, on aura 256. qui sera sous

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 121
sous le logarithme 8. lequel provient de
4. ajousté à soy - mesme.

20. Ainsi, si l'on veut trouver le nombre geometrique qui seroit sous le logarithme 16. il faudroit prendre 256. qui est sous 8. & le multiplier par soy - mesme, & on auroit 65536.

21. Que si encore on veut avoir le nombre geometrique qui devroit répondre au logarithme 23. il faut prendre deux logarithmes, qui joints ensemble fassent 23. comme 7. & 16. & multiplier les nombres geometriques qui leur répondent l'un par l'autre, sçavoir, 128. (qui est sous 7.) par 65536. (qui doit estre sous 16.) & le produit 8388608. fera celuy qui doit estre sous le 23. logarithme, c'est - à - dire, qui doit estre à la vingt - quatrième place, après le premier nombre 1.

22. D'où l'on voit comment on peut aisément répondre à la demande qu'on fait ordinairement, à combien reviendrait un cheval qu'on acheteroit à cette condition, que pour le premier clou du fer on donneroit un double, & pour le second clou deux doubles, pour le troisième quatre doubles, pour le quatrième huit, & ainsi jusqu'au vingt - quatrième : car le vingt - quatrième cousteroit 8388608. doubles, c'est - à - dire, 69905.

F


livres 8. doubles, & en doublant cette somme (suivant 8. 14.) on trouvera que tout le cheval aura cousté 139810. livres.

23. Si l'on avoit dans de grandes tables d'un livre de longues Progressions toutes faites, qui se répondissent ainsi, l'une geometrique, & l'autre arithmetique; on s'épargneroit bien de la peine à calculer, pour trouver les nombres geometriques: car si l'on nous donnoit ces trois nombres 32. 64. 128. & qu'on demandast le quatrième geometrique; au lieu de multiplier 64. par 128. & de diviser le produit par 32. (ce qui est fort ennuyeux dans les grands nombres) il ne faudroit que prendre le logarithme des trois nombres donnez, sçavoir, 5. 6. 7. ajouster 6. à 7. & du produit 13. oster 5. & il resteroit 8. qui seroit le logarithme du quatrième geometrique: de sorte que consultant la table pour voir quel nombre répond à 8. je trouverois 256.

24. Mais parce que dans une progression geometrique, comme celle-cy, tous les nombres ne se trouvent pas, on a trouvé le moyen de faire deux progressions, dont l'une, qui contient tous les nombres 1. 2. 3. 4. 5. &c. & qui semble estre la Progression arithmetique, a néanmoins les proprietéz de la geomé-

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 123
 trique ; & l'autre, qui contient des nom-
 bre en apparence plus irréguliers, est
 néanmoins la Progression arithmétique.
 Voicy une ligne qui fait comprendre
 parfaitement tous ces mysteres.


25. Soit la ligne droite A E divisée



par parties égales A B, B C, C D, D E,
 &c. Par les points A, B, C, &c. soient
 imaginées les lignes droites A a, B b,

F ij

Cc paralleles entre elles, qui soient en Progression geometrique: par exemple qu' Aa estant 1. Bb 10. Cc soit 100. Dd 1000. Ee 10000. &c. nous aurons deux Progressions de lignes, l'une arithmetique, & l'autre geometrique: car les



lignes AB , AC , AD , AE , seront en Progression arithmetique, comme 1. 2. 3. 4. & ainsi représenteront les loga-

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 125
 rithmes auxquels répondront les lignes
 géométriques Aa , Bb , Cc , &c.

26. Chacune des parties ED , DC ,
 &c. soit divisée également en F , G , H ,
 &c. & soient tirées les parallèles Ff ,
 Gg , &c. moyennes proportionnelles
 entre leurs collatérales, c'est-à-dire,
 Ee . $Ff :: Ff$. $Dd :: Dd$. Gg , &c.
 Derechef soient encore tirées d'autres
 moyennes proportionnelles par le mi-
 lieu de chaque partie EF , FD , DG ,
 &c. & ainsi de suite jusqu'à ce que ces
 lignes parallèles soient fort près les
 unes des autres, & qu'enfin on imagine
 une ligne courbe qui passe par les ex-
 trémités de toutes ces parallèles $efdg$,
 &c. on aura une ligne, dont les proprié-
 tés sont très-considérables, & les usa-
 ges très-grands, comme l'on verra en
 son lieu.

27. Si cette figure avoit esté formée
 sur une fort grande table, & avec tou-
 te la justesse requise, on pourroit divi-
 ser chaque partie AB , BC , &c. non
 seulement en 100. ou en 1, 000. mais
 en 10, 000. ou en 100, 000. ou en
 davantage. De sorte que AB étant de
 100, 000. AC seroit de 200, 000.
 & AD de 300, 000, &c. ce qui est
 toujours en Progression arithmétique.

28. La ligne Ee estant supposée de 10, 000 parties, imaginons que par chacune de ces parties soient tirées des parallèles à la ligne AE , qui coupent la courbe en autant de points. Par exemple, soit la ligne io tirée par la partie 9, 900. de Ee qui coupe la courbe au point o . Soit encore la parallèle oO , qui coupe la ligne AE , au point O dans la 399. 563. partie, & l'on connoistra par là que 399, 563. est le logarithme de 9, 900. De mesme, si Su passoit par la partie 9, 000 de la ligne Ee , & que uV coupast la ligne AE dans la 395, 424. ce nombre - cy seroit le logarithme de 9, 000. &c.

29. Ainsi l'on pourroit faire une table de logarithmes depuis 1. jusqu'à 10, 000. & mesme encore plus avant, si l'on vouloit allonger la ligne AE .

30. Remarquez qu'il suffit, pour avoir tous ces logarithmes depuis 1. jusqu'à 10, 000. de trouver les logarithmes depuis 1, 000 jusqu'à 10, 000. c'est-à-dire, (après avoir tiré la parallèle dt) en prenant les logarithmes de toutes les parties depuis t jusqu'à e , dont les logarithmes sont terminez entre E & D : car avec cela on aura les logarithmes de toutes les autres parties qui sont depuis t jusqu'à E , & dont

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 127
 les logarithmes sont entre D & A.
 Par exemple, O o estant de 9, 900.
 parties, & son logarithme 399, 563.
 ce mesme nombre servira aussi de lo-
 garithme pour n N 990. & pour y Y
 99. en changeant seulement le premier
 chiffre 3. parce que, suivant la compo-
 sition de cette ligne; O N, ou N Y,
 doivent estre égales à E D ou D C;
 ce que chacun pourra aisément dé-
 montrer. Ainsi O N, ou N Y con-
 tiendront 100, 000. & puisque A O
 est 399, 563. ostant O N 100, 000. il
 restera 299, 563. pour A N, duquel
 estant encore 100, 000. il restera 199,
 563 pour A Y, & de mesme façon ayant
 A V 395, 424. pour logarithmes de V u
 9, 000. on aura aussi 095. 424. pour
 logarithmes de X x 9. ou 195. 424. pour
 logarithmes de 90. ou 295, 424. pour
 logarithmes de 900.

31. Tout cecy se peut aussi réduire en
 pratique par le calcul, sans faire en ef-
 fer ces figures, mais seulement en se
 les imaginant toutes faites : car par
 l'arithmétique on peut trouver un nom-
 bre moyen proportionnel F f entre les
 deux D d & E e, & après cela encore
 des moyens entre D d & F f, ou entre
 F f & E e, &c. Mais ce que nous venons
 d'expliquer est suffisant, pour donner

F iijj

toute la connoissance que nous devons avoir de la nature & de l'artifice des logarithmes : car on ne doit pas se mettre en peine de les calculer en effet ; & de les trouver , puisque tout cela est déjà tout fait ; Dieu , pour le bien public , ayant suscité des personnes , à qui il a donné assez de patience , pour surmonter l'ennuy d'un travail qui devoit paroître insupportable : car nous sçavons que plus de 20. personnes gagées pour cela ont passé plus de 20. ans à calculer avec une assiduité infatigable.

32. Outre ces deux Progressions, il y en a une troisième, qu'on appelle *Harmonique*, lorsqu'en prenant trois termes qui se suivent immédiatement, on trouve que le plus grand est au plus petit, comme la difference du plus grand & du moyen est à la difference du moyen & du plus petit, comme 30. 20. 15. 12. &c. sont en Progression harmonique : car en prenant 30. 20. 15. la difference de 30. & de 20. est 10. la difference de 20. & 15. est 5. or $10. 5 :: 30. 15.$

33. Cette Progression peut diminuër à l'infini, mais non pas augmenter.

Tout ce que l'on a dit jusqu'à présent de cette Progression, n'est pas de grand usage, & je ne veux pas m'engager à dire icy des choses extraordinaires.

On verra dans la suite de cette Geometrie quelques propriétés assez considerables de cette Progression, qui pourront donner quelque éclaircissement, pour entendre ce que nous avons de la Musique des Anciens, dont l'obscurité n'a pas encore esté penetrée. On y démontrera le rapport que l'Hyperbole a avec cette Progression ; car comme l'angle rectiligne sert pour trouver entre deux données tant de moyennes que l'on voudra en raison arithmetique ; & que cette ligne courbe que nous venons de décrire pour les logarithmes, sert pour trouver aussi entre deux données autant de moyennes que l'on voudra en raison geometrique ; de mesme l'on fera voir que l'Hyperbole sert pour trouver entre deux données autant de moyennes que l'on voudra en raison harmonique.

34. Il y a encore la Progression des quarez, & celle des cubes, des quarré-quarez, surfolides, quarrécubes, &c. comme 1. 4. 9. 16. 25. 36. &c. qui sont tous les quarez, dont les racines sont les nombres naturels 1. 2. 3. 4. 5. 6. &c. De mesme, 1. 8. 27. 64. 125. 216. qui sont les cubes des mesmes nombres. De mesme, 1. 16. 81. 256. 625. 1296. qui sont les quarré-quarez des mesmes nombres, &c.

35. Dans la Progression des quarez mettant 0 pour premier terme, ainsi 0. 1. 4. 9. 16. &c. la somme de tous les

termes est plus grande que le tiers du dernier terme multiplié par le nombre des termes ; & cet excès qui est au dessus du tiers , est toujours d'autant plus petit , que le nombre des termes est plus grand. De mesme, dans la Progression des cubes, cette somme des termes est plus grande que le quart ; & dans les quarréquarrez , elle est plus grande que la cinquième partie , & ainsi consecutivement des autres. Pour prouver cecy , il suffit d'en faire une induction, comme l'on voit dans cette table, où le second

1	0	0	0	
1	1	1	2	$\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$
3	4	5	12	$\frac{5}{12}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{12}$
4	9	14	36	$\frac{7}{18}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{18}$
5	16	30	80	$\frac{9}{24}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{24}$
6	25	55	150	$\frac{11}{30}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{30}$
7	36	91	252	$\frac{13}{36}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{36}$

rang contient la progression des quarréz depuis 0. Le troisiéme rang contient les sommes des termes. Par exemple, l'on y voit que la somme depuis 0. jusqu'à 9. est 14. Le quatriéme rang contient le produit de chaque terme multiplié par le nombre des termes qui sont depuis 0 jusqu'à luy; lequel nombre est marqué dans le premier rang, comme 36. est le produit de 9. multiplié par 4. Le cinquiéme rang contient des fractions, qui marquent la proportion des nombres du troisiéme & du quatriéme rang, comme vis-à-vis de 14. & de 36. on trouve $\frac{7}{18}$; ce qui veut dire que 14. est à 36. comme 7. à 18. & qu'ainsi la somme des termes 14. est au produit de 9. multiplié par 4. sçavoir, à 36. comme 7. à 18. Davantage, dans ce mesme cinquiéme rang, après $\frac{7}{18}$ on voit encore ces caracteres; (ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{18}$) ce qui veut dire que $\frac{7}{18}$ valent autant qu'un tiers; & de plus une dix-huitième partie, parce qu'en effet $\frac{7}{18}$ valent autant que $\frac{6}{18}$ plus $\frac{1}{18}$, c'est-à-dire que

1	0	0	0	
2	1	1	2	$\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$
3	4	5	12	$\frac{5}{12}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{12}$
4	9	14	36	$\frac{7}{18}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{18}$
5	16	30	80	$\frac{9}{24}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{24}$
6	25	55	150	$\frac{11}{50}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{30}$
7	36	91	252	$\frac{13}{36}$ ou $\frac{1}{3} + \frac{1}{36}$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{18}$ de sorte que la somme 14. est le tiers du produit 36. & outre cela encore il contient de plus une dix-huitième partie de 36. De même, on trouve que 30. qui est la somme des termes jusqu'à 16. est plus du tiers de 80. qui est le produit de 16. par 5. & que l'excès est $\frac{1}{24}$: Car $\frac{30}{80}$ valent autant que $\frac{3}{8}$ ou que $\frac{9}{24}$ ou que $\frac{8}{24} + \frac{1}{24}$ ou enfin que $\frac{1}{3} + \frac{1}{24}$ Or $\frac{1}{24}$ n'est pas tant que $\frac{1}{18}$; ainsi

DE GEOMETRIE, LIV. VIII. 135

l'on voit dans la suite de cette table que ces excès qui sont au dessus du tiers, vont toujours en diminuant, à mesure que le nombre des termes croist :

car ces excès sont $\frac{1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1}{24 \quad 30 \quad 36 \quad 42 \quad 48}$, &c. le dénominateur de la fraction augmentant toujours de six.

36. Si l'on fait une table semblable pour les cubes, on trouvera que les fractions qui seront au dessus du quart diminuëront toujours en valeur, leur dénominateur augmentant de 4. à chaque nouveau terme qu'on ajouftera à la Progression ; & de mesme, à l'égard des autres Progressions, on trouvera, par de semblables tables, ce qui a esté dit généralement dans la proposition précédente.

Tout cecy sera tres-utile dans la suite de cette Geométrie, où l'on traitera encore de plusieurs autres Progressions.





LIVRE DERNIER.

Problemes , ou la Geometrie Pratique.

1. **O**N appelle *Probleme* en Geometrie , une proposition qui enseigne à faire quelque chose , & qui en démontre la pratique , au lieu que les *Theoremes* sont des propositions speculatives , dans lesquelles on considere les proprieté des choses toutes faites.

2. *D'un point donné a dans la ligne bac , tirer une perpendiculaire.* Prenez avec le compas deux parties égales de part & d'autre *ac* , & *ab* : il n'importe point que ces parties soient grandes ou petites , pourveu qu'elles soient égales. Ouvrez le compas un peu davantage , & des points *b* & *c* , comme des centres , tirez l'un après l'autre , deux petits arcs semblables , qui se croisent au point *d*. Puis

appliquant la regle sur les points *a* & *d*, tirez la ligne *ad*, & ce sera la perpendiculaire requise.

(2. 16.)



3. D'un point donné *d* tirer une perpendiculaire vers la ligne *bac*. Du centre *d* faites un arc de cercle, qui coupe la ligne en deux endroits *b* & *c*; puis de ces deux points *b* & *c* tirez avec la mesme ouverture du compas, deux petits arcs qui se croisent en *e*, la ligne *de* sera la perpendiculaire requise.

(2. 16.)

4. Lors que les points donnez *a* ou *d* sont vers les extrémités du papier ou de la surface où l'on doit faire la figure, & qu'on ne peut pas prendre une distance raisonnable au-delà du point *a*, suivant les pratiques précédentes; alors il faut faire ainsi. Quand le point *a* est donné dans la ligne,


prenez tel point que vous voudrez vers *e*, & de là comme du centre tirez un

cercle qui passe par *a*, & qui coupe la ligne en *b*: puis de *b* tirez la ligne *be*, qui, étant continuée, aille couper le



cercle en d ; la ligne $d a$ sera perpendiculaire sur $b a$. (4. 14.) Que si le point d est donné hors la ligne, & non pas le point a , tirez une ligne telle que vous voudrez $d b$, & du milieu de cette ligne e faites un cercle $b a d$, qui coupe $b a$ en a ; la ligne $d a$ sera la perpendiculaire requise. (4. 14.)

5. D'un point donné tirer une parallèle à une ligne donnée. Soit la ligne donnée $a b$, & le point c , par lequel il faut tirer une parallèle: du point c comme d'un centre, faites un arc de cercle, qui




coupe la ligne donnée en a : dans la mesme ligne donnée, prenez un point b tel

que vous voudrez, le plus éloigné néanmoins qu'il se pourra du point a , & de ce point b à la mesme ouverture de compas faites un autre arc de cercle d : prenez avec le compas la distance $a b$; & à cette mesme ouverture, du point c comme du centre, faites un arc qui coupe l'autre en d , appliquant la règle sur les deux points c & d , vous aurez la ligne $c d$ parallèle à $a b$: car le quadrilatere $c a b d$, a les costez opposez égaux par l'operation, & par


DE GEOMETRIE, LIV. IX. 137
 conséquent il est parallélogramme, par
 la converse de la 9. proposition du li-
 vre 3.

6. Entre deux lignes données $a e$ & $e c$,
 trouver la moyenne proportionnelle. Après
 avoir mis les deux lignes
 l'une après l'autre en li-
 gne droite, pour en faire
 la ligne totale $a c$, pre-
 nez-en le milieu f , & de
 ce point f décrivez le
 cercle $a b c$: levez la per-
 pendiculaire $e b$ qui coupe la circonferen-
 ce du cercle au point b , la ligne $e b$ sera
 moyenne, en sorte que $a e. e b :: e b. e c$.
 (6. 66.)



7. Faire un carré égal à un rectangle
 donné. Prenez la moyenne entre les cos-
 téz du rectangle, & le carré sur cette
 moyenne sera le requis. (6. 59.)

8. Trois lignes étant données, trouver
 la quatrième proportionnelle. Soient les li-
 gnes données $a d$, $d e$, $a b$,
 après avoir mis $a d$ & $a b$
 l'une sur l'autre, & $d e$ de
 travers, pour faire un trian-
 gle $a d e$, continuez le côté
 $a e$ vers c , & du point b
 tirez la parallèle $b c$, je dis que $b c$ sera
 la quatrième proportionnelle requise, &
 que $a d. d e :: a b. b c$. (6. 43.)



9. *Faire un parallelogramme rectangle égal à un triangle donné aeb .* Par le



sommet e tirez ec parallele à la base ab , le rectangle $abcd$ sera double du triangle aeb : (3. 18.) ainsi en partageant la base ab en deux également, & élevant une perpendiculaire, on fera un rectangle égal au triangle.

10. *Un rectangle étant donné, faire un autre rectangle qui luy soit égal, & qui ait la longueur donnée.* Soit le rectangle



donné abc , & qu'il en faille faire un autre égal, qui ait pour costé la longueur ef . Icy nous avons trois lignes données, sçavoir ab , bc , (qui sont les costez du re-

ctangle donné) & ef qui doit estre un costé de l'autre rectangle que l'on veut faire. On doit chercher maintenant une quatrième ligne, pour estre le deuxième costé de ce rectangle. Ayant ces trois lignes données, trouvez - en la quatrième proportionnelle (9. 8.) qui soit eh , en sorte que $ef.ab :: bc.eh$: je dis que le rectangle feh sera le requis égal au rectangle abc (6. 27.)


11. *Quarrer quelque polygone que ce soit.* Réduisez le polygone en triangles, (3. 22.

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 139

ou 24.) faites autant de rectangles égaux à ces triangles, (9. 9.) en sorte que tous ces rectangles ayent une même longueur: (9. 10.) joignez tous ces rectangles ensemble, pour en faire un rectangle total, & faites un quarré (9. 7.) égal à ce rectangle, & vous aurez ce que vous prétendiez.

12. *Diviser un cercle en quatre & en six, & tous les arcs en deux parties égales.* Pour le diviser en 4. il faut tirer

deux perpendiculaires par le centre, comme *d a c* & *B a e*. Si on veut le diviser en 8. on n'a qu'à diviser en deux chaque arc *Bc*, *ce*, &c. ce qui se fait en décrivant des




points *B* & *c*, deux arcs de cercles à la même ouverture du compas: car du point où ces deux arcs se croisent, on tirera vers le centre *a* une ligne qui divisera l'arc *Bc* en deux également: ainsi faut-il faire à l'égard des autres arcs. Pour diviser le cercle en six, il ne faut que prendre avec le compas le demi-diamètre: car l'appliquant six fois tout autour sur la circonférence, il la mesurera parfaitement: ainsi on peut ensuite diviser le cercle en 12. & en 24. & en 48. &c.

13. *Diviser un cercle en cinq, en quinze, & en d'autres parties égales.* Cela se peut faire géométriquement en cette manière, que je démontre dans l'Algebre. Faites un triangle rectangle, dont une jambe soit le demi-diametre du cercle, & l'autre la moitié du demi-diametre. De l'hypotenuse de ce triangle ostez la moitié du demi-diametre; ce qui restera sera la corde de 36. d. & le costé d'un décagone. En doublant cet arc, on aura l'arc de 72. d. qui est la cinquième partie du cercle; & la corde de ces 72. d. sera l'hypotenuse d'un triangle rectangle, dont une jambe est le demi-diametre, & l'autre le costé du décagone. Or comme d'ailleurs on a aussi trouvé 60. d. on aura encore la difference de 36. à 60. sçavoir, 24. d. qui est la quinzième partie du cercle. Mais pour la pratique, le plus court & le plus sûr, c'est de chercher avec le compas, à diverses reprises, une ouverture, qui estant appliquée cinq fois tout autour du cercle, le mesure précisément: après cela chacune de ces parties se divisera de même façon en trois, en cherchant avec le compas, & revenant quand on n'a pas bien trouvé justé du premier coup: ainsi on aura le cercle divisé en 15. Que si chacune de ces 15. parties se divise encore en qua-

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 141
 tre, & chacune de ces quatre en six, on
 aura tout le cercle divisé en 360. degrez.
 Et cette division est tres-commode pour
 l'usage. Remarquez qu'on n'a pas trouvé
 le moyen de diviser geometriquement
 un arc en trois parties égales, ni en
 cinq, ni en sept, ni en d'autres nom-
 bres impairs; je dis geometriquement,
 en n'employant que la ligne droite & le
 cercle.


*Cette division du cercle en 360. degrez
 est encore plus utile, quand on sçait se ser-
 vir du Compas de proportion: c'est une
 sorte de compas qui a les branches plates,
 a B, a C, sur lesquelles il y a diverses lignes
 & diverses divisions, dont celles qui sont le
 plus en usage se réduisent à deux: car sur
 un costé du compas
 il y a une ligne,
 en chaque branche
 a e B, & a e C, qui
 sert à diviser tout
 d'un coup un cercle
 en 360. & pour en prendre tout autant de
 degrez que l'on voudra. Cette division du
 compas se fait de cette sorte*



14. Marquer un compas de proportion
 pour la division du cercle. Imaginez le
 demi-cercle a E D B, qui soit parfaite-
 ment divisé en ses 180. degrez; si du
 point a par chaque degré on tiroit des

arcs qui coupassent la ligne $a e B$: par exemple, si du 60. degré E on tiroit l'arc $E e$, & si du 90. degré D on tiroit l'arc $D d$, &c. il faudroit marquer 60. dans la branche du compas, vis-à-vis de e , & 90. vis-à-vis de d , &c. Que si l'on en faisoit autant dans l'autre branche $a C$, on auroit ce costé du compas divisé comme il faudroit.

15. *Expliquer l'usage du compas de proportion pour diviser le cercle.* Soit le cercle donné $A f$, prenez avec le compas ordinaire le demi-diametre $A f$, & puis appliquant une pointe de ce même




compas ordinaire sur le point e , c'est-à-dire, sur le 60. degré d'une branche du compas de propor-


tion, écartez ou approchez l'autre branche, en sorte que l'autre pointe du compas ordinaire tombe précisément sur le point e de l'autre branche du compas de proportion, afin que la distance $e e$ soit égale au demi-diametre $A f$; alors si vous voulez trouver tout d'un coup 90. degrés du cercle donné, mettez les deux points du compas sur les deux points d, d , & transportez cette distance sur $f g$, & vous aurez l'arc

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 143
 fg de 90. degrez. Que si vous vouliez
 prendre 35. degrez, vous n'auriez de mes-
 me qu'à appliquer les pointes du compas
 ordinaire sur les points des lignes aB ,
 aC , dans lesquels est le 35. degré, &
 transporter cette distance sur le cercle
 donné, & ainsi faudroit-il faire pour
 tout autre degré que ce soit. Tout cela est
 fondé sur les propositions 42. 43. 49. 50.
 du livre sixième: car comme tous les
 cercles sont figures semblables, (6. 50.)
 la corde fg sera au demi-diametre Af
 comme la corde aD au demi-diametre
 eD , c'est-à-dire, comme ad à ae . D'ail-
 leurs les triangles add & $ae e$ sont sem-
 blables, & ainsi $dd. ee :: ad. ae$. Or dda
 esté fait égal à fg , & ee à Af : donc fg .
 $Af :: ad. ae$.

16. Marquer le compas de proportion pour
 la division des lignes droites. Du centre
 du compas soient ti-
 rées deux lignes droi-
 tes sur les branches
 vers B & vers C, les-
 quelles soient divisées
 chacune en 100. ou en
 200. parties égales : & cela servira
 pour diviser tout d'un coup une ligne
 donnée en autant de parties que l'on
 voudra. Par exemple, soit la ligne don-
 née bc , & qu'il en faille prendre $\frac{25}{100}$.




c'est - à - dire, 25. nonante-septièmes parties ; il faudroit pour cela diviser toute la ligne bc en 97. parties égales , pour en prendre ensuite 25. ce qui seroit bien long à faire ; mais avec le compas de proportion on le fait fort aisément. Prenez avec le compas ordinaire la longueur de la ligne bc , & appliquant une pointe sur la quatre-vingt-dix-septième partie B d'une branche du compas de



proportion , approchez ou écartez l'autre branche , en sorte que l'autre pointe tombe précisément sur la 97^e partie C de

l'autre branche ; alors mettez les deux pointes sur la 25^e partie ee de l'une & de l'autre branche , & transportez la distance ee sur bf , & bf sera justement $\frac{25}{97}$ de toute la ligne bc : ce qui est aussi fondé sur ce que les triangles ABC & Aec sont semblables.

17. Sur une ligne donnée faire un angle de tant de degrez que l'on voudra. Soit




la ligne donnée ac , & qu'il faille y faire un angle de 30. degrez. Du point

a,

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 145


de , comme du centre, faites un cercle $c f$, dans lequel vous prendrez avec le compas de proportion, ou autrement, 30. degrez depuis c jusqu'à f , & par ce 30. degrez vous tirerez la ligne $a f$, qui avec la ligne $a c$ fera un angle de 30. d.

18. *Connoissant les angles d'un triangle, & un costé, trouver les autres costez.* On vous dit qu'il y a un triangle dans le monde, dont la base $A C$ a dix toises, & les deux angles d'autour de la base sont l'un $A C B$ de 150. degrez, & l'au-



tre $C A B$ de 20. (& par consequent le troisieme angle vers la pointe sera de 10. afin que tous trois 150. 20. 10. ensemble fassent 180. c'est - à - dire, deux droits) & on vous demande combien de toises doit avoir chacun des deux autres costez $A B$, $C B$. Faites sur du papier, ou plû-

roft sur du carton fin, un triangle semblable $ac b$, en cette sorte : prenez une base à discretion ac de 10. pouces, ou de dix autres parties telles qu'il vous plaira : sur ca faites deux angles, l'un cab de 20. degrez, & l'autre acb de 150. degrez, (9. 17.) les deux lignes ab , cb se croiseront en quelque part, sçavoir en b . Mesurez donc combien de pouces il y a dans



ab ou dans cb : car vous serez assuré que tout autant de pouces que vous aurez trouvé en ab , il y aura aussi tout autant de toises dans AB ; & de même dans CB , autant que dans cb . Car puisque les triangles sont semblables ayant les angles égaux, ac sera à ab :: comme AC à AB .

19. Mesurer les distances, les hauteurs, les profondeurs, & généralement toutes les grandeurs des lieux éloignez & inac-

cessibles. Si au haut d'une montagne qui paroist de loin il y a une tour BE , & qu'on veuille en observer la distance & la hauteur; il faut avec quelque sorte d'instrument, (comme est un Quart-de-nonante, c'est-à-dire, un quart de cercle divisé en 90. degrez garni d'une regle qui roule autour du centre, laquelle s'appelle *Alidade*) il faut, dis-je, avec cet instrument prendre deux angles de deux divers endroits en cette maniere. Si vous estes en A , placez l'instrument en telle sorte qu'un costé réponde justement à la ligne horizontale AD , sans hausser, ni baisser de part ou d'autre: mettez l'œil en A , c'est-à-dire, vers le centre de l'instrument, & tournez la regle en telle sorte qu'elle soit dirigée vers la pointe de la tour B ; si-bien que cette regle rase ainsi vostre rayon visuel, par lequel vous regardez la pointe B ; alors cette regle vous marquera dans la circonférence, de combien de degrez est l'angle $BA D$: car les degrez sont marquez dans cette circonférence de l'instrument. Après cela changez de place, & dans un lieu bien plein & uni avancez-vous de 10. toises (ou de telle autre distance qu'il vous plaira) jusqu'à C , & là, prenez derechef un autre angle $BC D$, par le moyen duquel vous aurez l'angle


G ij

de suite B C A , puisque ces deux ensemble sont égaux à deux droits : ainsi dans le triangle A C B vous connoissez la base que vous avez prise de 10. toises : vous connoissez encore les deux angles qui sont sur la base ; & par conséquent vous avez de quoy connoître le costé C B , ou le costé A B. (9. 18.) Vous connoîtrez encore la hauteur B D , ou la distance A D , si dans le petit triangle semblable vous tirez du point *b* une perpendiculaire *b d* ; car B D ou A D auront autant de toises que *b d*, ou *a d* auront de pouces. Que si après avoir pris la hauteur B D , on prend encore par la mesme methode la hauteur E D , on aura aussi la grandeur B E depuis le haut jusques au bas de la tour.

Quelquefois au lieu d'avancer vers la tour, & de faire les observations de haut en bas, ou des angles que font les lignes visuelles avec la ligne horizontale; il est bon de faire les deux stations à costé l'une de l'autre : mais cela revient toujours au mesme, & la pratique n'en est point au fond differente. L'on voit bien aussi que par ce moyen on peut mesurer toutes les grandeurs imaginables, pourveu qu'on en puisse observer les extrémités de deux endroits differens. On ne s'arreste pas icy à décrire les pratiques particulieres, ni les avantages que l'on re-

tire des lunettes que l'on a trouvé le moyen de mettre à l'Alidade de l'instrument, qui est une commodité inestimable.

20. *Prendre le plan d'une Place.* Soit une Ville ou autre Place A B C D E, & qu'on vous ordonne d'en prendre le plan, &



d'en faire la figure; prenez toutes les distances des costez & des lignes tirées d'angle à angle, & rapportez-les à proportion dans une figure sur du papier: par exemple,

ayant trouvé qu'A B est de 30. toises, B C de 59. C D de 50. B E de 67. A E de 49. &c. après avoir fait une échelle sur du papier, divisée en 100. petites parties, faites une ligne *a b* de 30. parties, *b e* de 67. *a e* de 49. ces lignes jointes ensemble font le triangle *a b e* tout semblable au triangle A B E, & continuant ainsi à faire *b e c* semblable à B E C, &c. vous aurez une figure totale *a b c d e* semblable à la place A B C D E.

21. Que si on ne peut pas entrer dans la place, ou la percer pour mesurer la distance des angles B E, F C, il faut prendre les angles de la place, & les rapporter sur la figure, en sorte que si l'angle B A E est de 66. degrez, l'angle *b a e* soit aussi de 66. degrez: ainsi des autres.

G iij

22. *Faire la carte d'une Ville ou d'un Pais.* Montez sur deux lieux élevez A & B, d'où l'on puisse découvrir la Ville ou le Pais dont vous voulez faire la carte : ayez un quart de 90. ou un cercle tout entier, ou bien un demi-cercle seulement divisé par degrez avec son alidade au centre ; placez premierement l'instrument sur A, en sorte qu'un de ses costez réponde d'A vers B : l'instrument estant ainsi



placé & affermi, regardez les clochers, les maisons extraordinaires, ou les montagnes, & autres endroits considerables, comme E, D, C, &c. & prenez tous ces angles avec l'alidade, & écrivez tout cela pour vous en souvenir ; l'angle C A B, par exemple, est de 50. degrez 30'. l'angle D A B de 45. degrez 8'. &c. puis faites-en autant de dessus B. & écrivez, l'angle A B C

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 151
 est de 40. d. 10'. l'angle ABD de 47. d. 28'. &c. Après quoy prenez sur du papier une ligne à discretion ab , & faites des angles égaux à ceux que vous avez trouvez : cab égal à CAB , dab égal à DAB , abc à ABC , &c. & ainsi vous aurez les points c, d, e , &c. qui seront dans la mesme disposition que les clochers ou les autres endroits considerables, C, D, E , &c. Or ayant une fois ces endroits principaux, tout le reste se peut tracer à veüe d'œil. Pour faire une operation plus juste, il est bon de prendre les angles encore d'un troisieme lieu, & mesme d'un quatrieme ; afin que tout s'accordant, on sçache que l'operation est bien faite.

23. *Connoissant deux costez d'un triangle, & l'angle d'entre deux, trouver le troisieme costé & les deux autres angles.*

24. *Connoissant deux costez & un angle opposé à un de ces costez, connoistre le troisieme costé & les deux autres angles : pourveu qu'on sçache si l'angle qu'on cherche est aigu ou obtus.*


25. *Connoissant les angles & un costé, connoistre les autres costez.*

26. *Connoissant les trois costez, connoistre tous les angles.* Tout cela se trouve parfaitement, en faisant des triangles semblables sur du carton fin.

27. *Mesurer l'aire, (c'est - à - dire , la*

G iiij

grandeur ou la capacité intérieure) d'un triangle donné $a b c$. Du sommet b tirez la perpendiculaire $b d$ sur la base $a c$ prolongée, s'il en est besoin ; divisez $a c$ en 10. (ou en tant d'autres parties qu'il vous plaira) & voyez combien de ces parties



sont contenuës dans $b d$: car en multipliant la moitié de $b d$ par 10. vous aurez l'aire du

triangle, (3. 18.) Comme si $b d$ contient 12. parties de celles dont $a c$ en contient 10. il faut multiplier 6. par 10. pour avoir 60. qui est la grandeur du triangle $a b c$. c'est - à - dire , que ce triangle contient autant d'espace qu'en contiendroient 60. petits quarrés , dont le costé de chacun seroit la dixième partie de $a c$.

Ayant égard à la pratique, il n'y a point de methode plus facile, ni mesme plus exacte, que celle-cy : mais en de certains cas, il est bon de sçavoir mesurer ces choses avec une certaine précision qui ne peut se trouver que par le moyen du calcul. Voicy donc les principes d'où l'on tire tout l'artifice du calcul.

28. Dans un triangle rectangle $a b d$, connoissant deux costez, connoistre le troisième costé par le calcul. Soit la jambe $b d$ de 3. toises, & la jambe $a d$ de 4. toises ; mul-


DE GEOMETRIE, LIV. IX. 153

multipliez 3. par 3. & 4. par 4. pour faire les deux quarez 9. & 16. ces deux quarez joints ensemble seront égaux au carré de l'hypoténuse ab : (6. 61.) & par conséquent je voy que le carré de ab est 9. plus 16. c'est-à-dire 25. ainsi pour sçavoir la grandeur de ab , je n'ay qu'à prendre le costé ou la racine carrée de 25. qui est 5. d'où je conclus que ab est de 5. toises. Si l'hypoténuse ab 5. est connue avec une jambe ad 4. il faut soustraire le carré 16. du carré 25. & il restera 9. dont la racine 3. est la grandeur de l'autre jambe bd . Quelquefois il arrive que les deux quarez des jambes joints ensemble ne font pas un nombre carré, ou que le carré d'une jambe soustrait du carré de l'hypoténuse ne laisse pas un nombre carré: comme si les jambes sont 2. & 3. leurs quarez seront 4. & 9. qui joints ensemble font 13. Or 13. n'est point nombre carré, & par conséquent n'a point de racine précise: mais néanmoins il y a des nombres qui en approchent, comme icy $3\frac{3}{5}$ est à peu près la racine de 13. car $3\frac{3}{5}$ multiplié par soy-mesme, fait 13. moins $\frac{1}{25}$: ainsi le costé ab est de $3\frac{3}{5}$, & d'un peu davantage.

G v

On ne donne pas la methode d'extraire ces racines quarrées, parce que c'est une regle d'Arithmetique, de quoy on ne traite pas icy.

29. Calculer la Tangente, la Secante, & le Sinus de 30. degrez. Soit, par exemple, ba le rayon ou sinus total, ad la secante



te de 30. degrez, bd la tangente, ce le sinus; il est aisé de voir que bd est la moitié de ad : car en tirant ag une autre secante de 30. de-

grez, le triangle gad sera équilateral: car chacun des angles g , d , & gad sera de 60. degrez: ainsi bd estant la moitié de dg , elle sera aussi la moitié de ad : par mesme raison ce fera la moitié de ac . Supposant donc dans le triangle rectangle aec , que l'hypotenuse ac est de 2. & la jambe ec d'1. & ostant le quarré 1. du quarré 4. nous aurons 3. égal au quarré du costé ae , égal à co . (qui est le sinus de l'arc ci de 60. degrez.) Mais si au lieu de prendre 2. & 1. pour ac , & ce , nous prenons 1, 000, 000 & 500, 000, le quarré de ce , sçavoir 250, 000, 000, 000 osté du quarré 1, 000, 000, 000, 000, laissera 750, 000, 000, 000, dont la racine à peu près est 866, 025. pour ae , ou ce sinus de 60. degrez.

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 155


30. Connoissant ce , le sinus d'un angle quelconque, connoistre co , le sinus du complement de cet angle. Le complement d'un angle est celuy qui reste pour faire 90. degrez. Par exemple, ayant l'angle cab de 30. degrez, son complement est cai de 60. degrez; car 60. avec 30. font 90. d. Cette proposition est démontrée dans la précédente.

31. Connoissant ec le sinus d'un angle, & le sinus de son complement, sçavoir co ou ae ; connoistre la tangente bd , & la secante ad . Comme les triangles aec & abd sont semblables, il s'ensuit que $ae. ec :: ab. bd :: \& ae. ac :: ab. ad :: \&$ ainsi par la regle-de-trois d'Arithmetique, on trouve que l'arc cb estant de 30. degrez, la tangente bd est de 577, 350. & la secante ad de 1, 154, 700.

32. Connoissant le sinus, la tangente & la secante d'un arc quelconque bc ; trouver le sinus, la tangente & la secante de la moitié de cet arc. Tirant af par le milieu de l'arc bc , on aura $df. fb :: ad. ab.$ (6. 72.) & par consequent on trouvera la tangente bf de 15. degrez, & ensuite le sinus & la secante des mesmes 15. degrez: après quoy encore, partageant derechef en deux l'arc bf , on trouvera le sinus, la tangente & la secante de 7. degrez 30'. & puis de 3. d. 45'. & ainsi à l'infini.

G vj

33. *Trouver le sinus c e de 45. degrez.*
Il est égal au sinus du complement des



mesmes 45. degrez, sçavoir à *e a.* & par consequent on trouve encore la tangente & la secante de 45. degrez aussi-bien que des moi-

tiez 22. degrez 30'. 11. degrez 15'. &c.

34. *Trouver le sinus de 36. d.* Ayant inscrit un pentagone régulier dans le cercle, on sçait la proportion qu'a le costé de ce pentagone avec le rayon. (9. 13.) Or ce costé est la corde de 72. degrez, & la moitié de cette corde est le sinus de la moitié de 72. sçavoir de 36. Ainsi le sinus de 36. d. est connu, & par consequent aussi la tangente & la secante aussi-bien que des moitez 18. degrez, 9. degrez, 4. degrez 30'. 2. d. 15'. &c.

35. *Trouver le sinus, la tangente, & la secante de 12. degrez, & des moitez 6. degrez, 3. degrez, 1. degré 30'. 45'. &c.* Puis qu'on connoist la corde de 24. degrez, qui est le costé d'un polygone régulier de 15. costez. (9. 13.) on connoistra, &c.

36. Combinant ainsi toutes ces choses, on aura les sinus, tangentes & secantes des angles de 45'. d'1 degré 30'. de 2. de

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 137
grez 15'. de 3. degrez 45'. de 4. 30'. ainsi
de tous les autres de 45'. en 45'.


37. *Trouver les sinus de tous les arcs qui
sont entre deux de ces arcs ainsi trouvez de
45'. en 45'. Il faut faire une regle de pro-
portion. Par exemple, le sinus de 45'.
estant 1308. le sinus de 1'. sera 29. parce
que $45.1'::1308.29.$ de mesme, le sinus
de 20. sera 581. De mesme, pour avoir le
sinus de 3. degrez 30'. ayant le sinus de 3.
degrez 5233. (9.35.) & puis le sinus de 3.
degrez 45'. 6540. (9.32.) on trouve que
ces 45'. qui sont depuis 3. degrez jusques
à 3. degrez 45'. portent 1307. d'augmen-
tation de sinus: car 5233. sinus de 3. de-
grez, ostez de 6540. sinus de 3. degrez 45'.
laissent 1307. Voulant donc trouver le
sinus de 3. degrez 30'. je dis ainsi: Si 45'.
qui sont depuis 3. degrez jusqu'à 3. degrez
45'. portent 1307. d'augmentation dans le
sinus, combien d'augmentation porteront
30'. qui sont depuis 3. degrez jusques à 3.
degrez 30'. & je trouve 871. il faut donc
ajouster 871. à 5233. & on aura 6104. pour
sinus de 3. degrez 30'. ainsi de tous les
autres.*

*Par ce moyen on peut faire des tables où
soient les sinus, les tangentes & les secantes
de tous les angles de minute en minute de-
puis 0. jusqu'à 90. degrez.*

Remarquez que par cette dernière regle

on ne trouve pas à la rigueur le sinus juste, parce que les sinus n'augmentent pas à mesme proportion que les arcs : mais ce defaut est icy si petit, qu'on ne doit pas se mettre en peine d'une plus exacte précision.

38. Par le moyen de ces tables on calcule les triangles, parce



qu'on est assuré que dans tout triangle, les costez sont entre eux comme les sinus des angles opposez : par ex.

dans le triangle abc , tirant le cercle circonscrit du centre e , les perpendiculaires ei , eh , partageront en deux également les costez ab & bc . (4. 6.) ainsi $ab.bc :: ai.bh$. Or ai est le sinus de l'angle aei ou acb , qui (4. 13.) luy est égal, & de mesme bh est le sinus de l'angle $b eh$ ou $b ac$: donc, &c.

39. Et sur ce principe, connoissant deux angles & un costé, ou deux costez & un angle, trouver tout le reste. Faites par une regle de proportion, comme un costé connu au sinus de l'angle opposé connu ; ainsi l'autre costé connu a un quatrième nombre qui sera le sinus de l'angle opposé à cét autre costé. Ou bien si deux angles sont connus avec un costé, il faut faire comme le sinus d'un angle connu au costé opposé

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 159

à ce même angle : ainsi le sinus de l'autre angle connu à un quatrième nombre, qui sera le costé opposé à cet autre angle ; &c.

40. Ces operations sont beaucoup abrégées par les logarithmes : car on a eû soin de mettre dans les tables, non seulement les sinus & les tangentes, mais aussi leurs logarithmes, qui leur répondent vis-à-vis. De sorte qu'au lieu des multiplications & des divisions qu'il faudroit faire avec une peine insupportable, en se servant des sinus & des tangentes, il ne faut que faire des additions ou des soustractions, en employant les logarithmes : comme si dans le triangle A B C, (9. 18.) dont le costé A C est connu de 10. toises, l'angle A B C de 10. degrez, l'angle C A B de 20. on demande le costé B C, il faudroit dire comme le sinus de l'angle B, (qui est dans les tables 17364.) au costé A. C, qui est connu de 10. toises : ainsi le sinus de l'angle A (qui est dans les tables 34202.) est au costé qu'on cherche C B. Pour trouver ce quatrième C B par une regle-de-trois, il faudroit multiplier le second terme 10. par le troisiéme 34202. & diviser le produit 342020. par le premier 17364. ce qui est bien long. Mais si au lieu de ces nombres nous prenons leurs logarithmes, ajoutant le logarithme de 20. degrez au loga-

Sin. angl. A. 20. d.	9. 5340517.
A C. 10. toises.	1. 0000000.
Somme.	10. 5340517.
Sin. angl. B. 10. d.	9. 2396702.
Reste, qui est	
CB. 19. $\frac{7}{10}$ toises.	1. 2943815.

rithme de 10. toises, & de la somme ostant le logarithme de 10. degrez, il reste le logarithme 1. 2943. &c. qui dans la table répond entre 19. & 20. de sorte que le costé CB. doit estre de prés de 20. toises.

Les livres qui traitent des sinus & des logarithmes expliquent cecy plus en particulier. Je croy pourtant en avoir dit autant qu'il en faut sçavoir pour pouvoir trouver de soy-mesme toutes ces choses. On ajousterá quelques autres propositions sur ce sujet dans la suite de cette Geométrie.

41. Trouver une ligne droite, qui soit égale à la circonference d'un cercle à si près que l'on voudra : prenant douze fois la tangente de 30. degrez qui est *b d*, & rangeant ces 12. tangentes au tour du cercle, en sorte qu'elles soient jointes deux à deux en ligne droite, comme on voit en la

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 161

figure de l'art. 27. où dg sont deux tangentes opposées, chacune de 30. degrez, & de mesme gh , & di , &c. On fera ainsi un polygone circonscrit de 6. costez, dont la circonference est plus grande que celle du cercle. (4. 27.) Que si on prend douze fois le sinus ce , on fera un polygone inscrit de 6. costez, dont la circonference est plus petite que celle du cercle. De sorte que donnant au rayon ab , 1, 000, 000; bd , qui est 577, 350 pris douze fois, c'est-à-dire, 6, 928, 200. est plus grand que la circonference du cercle, & ec 500, 000 pris douze fois, sçavoir, 6, 000, 000, est plus petit que la circonference du mesme cercle.

42. Mais si au lieu de prendre douze fois la tangente & le sinus de 30. degrez, l'on prend 360. fois la tangente & le sinus d'un degré, sçavoir 17455. & 17452. on fera deux polygones, l'un circonscrit 6, 283, 800 plus grand, & l'autre inscrit 6. 282, 720 plus petit que le cercle.

43. Enfin donnant au rayon 100, 000, 000, 000, & prenant la tangente & le sinus d'une minute 21600 fois (car il y a autant de minutes dans un cercle) on aura 628, 318, 512, 000 plus petit, (car le sinus d'1'. est 29, 088, 820.) & 628, 318, 533, 600 plus grand. (car la tangente d'1'. est 29, 088, 821.) Que si ces trois nom-

DE GEOMETRIE, LIV. IX. 16;
fait 3141000. pour tout l'aire du cercle :
(4. 31.) mais si le demi-diametre est de
quelque autre mesure, par exemple de 9.
pouces, il faut faire 1000. 3141 : : 9. 16

$\frac{269}{1000}$, & puis multiplier ce dernier nombre
(qui doit estre la demicirconference) par
9. (qui est le demidiametre) & on a 17;

$\frac{421}{1000}$ pour l'aire du cercle.

*Il est plus commode, ce me semble, de
se servir de cette proportion de 1000. à
3141. que de celle dont on se sert commu-
nément de 7. à 22. perpendiculaire.*

46. *Mesurer la grandeur d'un parallele-
pipede ou d'un cylindre.* Multipliez sa base
par sa hauteur perpendiculaire.

47. *Mesurer une pyramide ou un cone.*
Multipliez la troisieme partie de sa base
par sa hauteur.

48. *Mesurer une sphere.* Multipliez la
troisieme partie de sa surface par le demi-
diametre, ou bien les deux tiers de son
plus grand cercle par son diametre.

F I N.



T A B L E

DES MOTS EXPLIQUEZ en cette Geométrie.

Le premier chiffre signifie le livre,
& les autres, l'article.

<i>A</i> ire, capacité ou grandeur d'une figure.	<u>9. 25</u>
Alternando, invertendo, &c.	<u>6. 9. 8</u>
<i>Amblygone</i> , ou obtusangle.	<u>2. 5</u>
Angles alternes, internes.	<u>1. 30</u>
Angle droit, obtus, aigu.	<u>1. 17</u>
Angles externes du triangle.	<u>2. 10</u>
Angles opposez, de suite.	<u>1. 17</u>
Angle rectiligne, curviligne, mixte.	<u>1. 6</u>
Angle soutenu, ou soutendu, ou oppose.	<u>2. 17</u>
Arc.	<u>1. 11</u>

C

<i>C</i> ercle.	<u>1. 10</u>
Circonference.	<u>2. 10</u>
Commensurables.	<u>7. 4</u>
Commensurable en puissance.	<u>7. 33</u>
Compas de proportion.	<u>9. 14</u>
Complements dans le parallelogramme.	<u>3. 12</u>
Complement d'un angle.	<u>9. 30</u>
Congruës figures.	<u>2. 12</u>
Converse proposition.	<u>1. 33</u>

T A B L E.

Convertendo, Componendo, &c. 6. 11. 12. &c.

Corps ou solide. 1. 4

Costez ou racines des nombres. 7. 10

Cubique nombre. 7. 39

D

Degrez de progression. 8. 16

Degrez, minutes, secondes. 1. 24

Diagonale, diametre, ligne tirée d'angle à angle dans les parallelogrammes. 3. 7

Diametre. 1. 12. & 3. 7

E

Equilateral. 2. 7

Equimultiple. 6. 15

Ex æquo, proportion. 6. 13. 14

G

Geometrique progression. 8. 8

Gnomon ou esquierre. 3. 12

Grandeur. 6. 1

H

Harmonique progression. 8. 32

Homologues costez. 6. 31

Hypotenuse, grand costé du triangle rectangle. 6. 61

I

Ambes, costez autour de l'angle droit d'un triangle. 6. 61

Incommensurables. 7. 5

Invertendo, alternando, &c. 6. 8. 9. &c.

Isoperimetres. 4. 32. à la fin.

Isocele, triangle à deux jambes égales. 2. 7

L

Logarithmes. 8. 16

T A B L E.

M

M <i>Esurer.</i>	<u>7. 2</u>
<i>Minutes, degrez.</i>	<u>1. 24</u>
<i>Multiplier une ligne par une autre ligne, ou par une surface.</i>	6. 17. 18

N

N <i>Nombre plan.</i>	<u>7. 9</u>
<i>Solide.</i>	<u>7. 37</u>
<i>Nombres plans semblables.</i>	<u>7. 14</u>
<i>Nombre quarré.</i>	<u>7. 12.</u>
<i>Cubique.</i>	<u>7. 39</u>

O

O <i>Blique, ligne.</i>	<u>1. 15</u>
<i>Oxygone ou acutangle.</i>	<u>2. 5</u>

P

P <i>Aralleles.</i>	<u>1. 26</u>
<i>Parallelogramme.</i>	<u>3. 2</u>
<i>Parallelogrammes d'autour du diametre.</i>	<u>3. 12</u>

<i>Partie.</i>	<u>7. 2</u>
<i>Parties.</i>	<u>7. 3</u>
<i>Perpendiculaire.</i>	<u>1. 15</u>
<i>Plan ou surface plane.</i>	<u>1. 5</u>
<i>Pouvoir: une ligne peut deux fois une autre.</i>	<u>7. 52</u>

<i>Problèmes, Theorèmes.</i>	<u>9. 1</u>
<i>Progression Arithmetique.</i>	<u>8. 2.</u>
<i>Geometrique.</i>	<u>8. 8.</u>
<i>Harmonique.</i>	<u>8. 32</u>

<i>Progression des quarez, des cubes, &c.</i>	<u>8. 34</u>
<i>Proportion.</i>	<u>6. 6</u>

<i>Puissance premiere.</i>	<u>7. 32.</u>
<i>Seconde.</i>	<u>7. 35</u>

Q

Q <i>uadrilatre, figure à quatre costez.</i>	<u>3. 1</u>
<i>Quantité.</i>	<u>1. 1</u>
<i>Quarré-quarré, sursolide, &c.</i>	<u>8. 10</u>

T A B L E

R

R acines ou costez des nombres.	<u>7. 18</u>
Raison.	<u>6. 2</u>
Raison composée.	<u>6. 26</u>
Raison doublée. <u>6. 29. 30.</u> Triplée.	<u>6. 36</u>
Raison égale ou proportion.	<u>6. 4. 6</u>
Raison plus grande.	<u>6. 5</u>
Rayon ou demi-diametre. <u>1. 13.</u> ou Sinus total.	<u>4. 9</u>
Réciproques.	<u>6. 65</u>
Rectangle simplement pour parallelogramme rectangle.	<u>3. 3</u>
Rhombe ; Lozange.	<u>3. 4</u>
Rhomboïde, Lozange irrégulier.	<u>3. 5</u>

S

S calene, triangle à trois costez inégaux.	
<u>2. 2.</u> Cone ou cylindre ou parallelepipede.	<u>5. 12</u>
Secante, tangente, sinus.	<u>4. 9</u>
Semblables triangles. <u>6. 44.</u> Rectangle.	<u>6. 39</u>
Solides. <u>6. 54.</u> Figures.	<u>6. 48. 49</u>
Sinus, tangente, secante.	<u>4. 9</u>
Sinus du complement.	<u>9. 28</u>
Solide corps. <u>1. 4.</u> Angle solide.	<u>5. 4</u>
Surface plane ou plan.	<u>1. 4</u>
Sursolide quarré, cube, &c.	<u>8. 10</u>

T

T angente, sinus, secante.	<u>4. 9</u>
Termes de progression.	<u>8. 1</u>
Theorèmes, problèmes.	<u>9. 1</u>
Trapeze, quadrilatere irrégulier.	<u>3. 6</u>

EXTRAIT DU PRIVILEGE du Roy.

PAR Lettres Patentes du Roy, données à Saint Germain en Laye le 31. jour de Mars 1680. signées LE PETIT, & scellées du grand Sceau de cire jaune, il est permis à SEBASTIEN MABRE-CRAMOISY, Imprimeur ordinaire de Sa Majesté, de rimprimer en telle forme, de tel caractère, & autant de fois qu'il voudra, *Tous les Traitez de Mathematique du P. Ignace Gaston Pardies*, & ce pendant le temps & espace de dix années consecutives, à compter du jour que chacun desdits Traitez aura esté imprimé pour la premiere fois en vertu desdites Lettres. Avec défenses à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soient, d'imprimer, ou faire imprimer lesdits Traitez, sous les peines portées par lesdites Lettres.

Registré sur le Livre des Libraires & Imprimeurs de Paris le 27. Avril 1683.
Signé, C. ANGOT, Syndic.

La Geometrie a esté achevée d'imprimer pour la premiere fois en vertu du Privilege cy-dessus le 25. Juin 1683.